



9

الفصل الدراسي  
الأول

مادة تدريبية في

# الرياضيات

إعداد

أ. دلال عوض      أ. نفين المدهون      أ. إنعام أبو شرار

تحت إشراف المختصة التربوية

أ. فاطمة أبو عكر

منطقة جنوب غزة التعليمية

2020-2019



## الوحدة الأولى الأعداد الحقيقية

### الدرس الأول : الاعداد الحقيقة

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١.١ )  $\text{ط} \subseteq \text{ص} \subseteq \text{ن} \subseteq \text{ح}$

١.٢ )  $\text{ح} = \text{n} \cap \text{N}$

١.٣ ) مجموعة الأعداد الغير نسبية مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقة

١.٤ ) يعتبر العدد  $2,151\overline{001}$  عدد غير نسبي

١.٥ )  $0,72 > \overline{0,72}$

١.٦ )  $\sqrt{1327}$  ينحصر بين ١٢ ، ١١

١.٧ ) جميع الجذور التربيعية اعداد غير نسبية

٢) اختر الاجابة الصحيحة :-

- جميع ما يلي اعداد حقيقة ما عدا واحدة

أ)  $\overline{2,3}$

ب)  $\sqrt{25}$

ج)  $\sqrt{-4}$

د)  $\pi$

- جميع ما يلي صحيح ما عدا

أ)  $\text{ص} \subseteq \text{ح}$

ب)  $\text{ح} \cap \text{n} = \emptyset$

ج)  $n \cap \text{N} = \text{n}$

د)  $\text{ص} \subseteq \text{ط}$

- احد الاعداد التالية غير نسبي

أ)  $\frac{3}{4}$

ب)  $\sqrt{9}$

ج)  $\sqrt{1,2}$

د)  $\sqrt{7}$

- يعتبر العدد  $\sqrt{5} - 3$  عدد

أ) طبيعي

ب) نسبي

ج) غير نسبي

د) صحيح

- العدد  $\sqrt[3]{125}$  يعتبر عدد

أ) نسبي

ب) صحيح

ج) طبيعي

د) جميع ما سبق

- أكمل العبارات الآتية :-

- يُعتبر  $\pi$  عدداً ..... أما العدد ٣٤،٢ فهو .....
  - كل عدد غير دوري وغير منتهي هو عدد .....
  - الجذور التكعيبية لأعداد لا تمثل مكعب كامل تعتبر جذور .....
  - يسمى المستطيل الذي طوله يساوي طول قطر مربع و عرضه يساوي طول ضلع هذا المربع ..... بالمستطيل

٤) قارن بوضع اشارة < أو > أو =

$$\frac{74}{\boxed{\phantom{00}}}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

٥) أمثل بشكل تقربي الأعداد الحقيقة الآتية بنقاط على خط الأعداد

صفر ،  $\frac{1}{2}$  ،  $1, \overline{3}$  ، ٢ ،  $\pi -$  ،  $\sqrt{12}$  واكمـل ترتيبـها تصاعـدياً



## الدرس الثاني : جمع الاعداد الحقيقة وطرحها

**١) اكمل العبارات الآتية :-**

#### ١) تتمتع عملية الطرح في ح بخاصية .....

٢) العنصر المحايد لعملية جمع الاعداد الحقيقة هو .....

$$(في أبسط صورة) \dots = \sqrt{32}, \dots = \sqrt{75} (3)$$

$$\dots = \cdot, \overline{\xi} + \cdot, \overline{\gamma} (\xi)$$

٥) النظير الجمعي للعدد  $-2 + \sqrt{7}$  هو ..... بينما النظير الجمعي للعدد  $\frac{3}{\sqrt{5}}$  هو .....

$$\dots = \cdot, \overline{v} + \cdot, \overline{r} (7)$$

$$\dots \text{ خاصية } (\sqrt{15} + 0,2) + \frac{1}{\xi} = \sqrt{15} + (0,2 + \frac{1}{\xi})$$

- جد الناتج في ابسط صورة :-

$$\dots = 12 + \sqrt[3]{27} \quad (1)$$

$$\dots = 0,3 - 1,5 \quad (2)$$

$$\dots = 0,5 + 0,7 \quad (3)$$

$$\dots = 0,9 + 2,6 \quad (4)$$

$$\dots = \sqrt{9} + 10 + \sqrt[3]{1000} \quad (5)$$

- جد الناتج في ابسط صورة :-

$$\dots = \sqrt{7} \sqrt{2} - \sqrt{7} \sqrt{3} + \sqrt{7} \sqrt{4} \quad (1)$$

$$\dots = \sqrt{5} \sqrt{3} + \sqrt{3} \sqrt{8} - \sqrt{5} \sqrt{6} + \sqrt{3} \sqrt{10} \quad (2)$$

$$\dots = \sqrt{3} \sqrt{-} \sqrt{12} \quad (3)$$

$$\dots = \sqrt{20} - \sqrt{5} \sqrt{6} + \sqrt{45} \quad (4)$$

$$\dots = (\sqrt{63} + \sqrt{7} \sqrt{5}) - \sqrt{28} \quad (5)$$

$$\dots = \sqrt{16} (\sqrt{2} + \sqrt{8}) \quad (6)$$

$$\sqrt{5} \sqrt{2} - \sqrt{5} \sqrt{2} s = 2 \quad (3)$$

- حل المعادلات الاتية :-

$$\sqrt{18} s - \sqrt{2} = \sqrt{2} \quad (1)$$

$$\sqrt{5} \sqrt{6} + \sqrt{45} s = 6 \quad (4)$$

$$1 + s = 2 s - 4 \quad (2)$$

### الدرس الثالث : ضرب الاعداد الحقيقة وقسمتها

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١. ( ) تتمتع عملية ضرب الاعداد الغير نسبية بخاصية الانغلاق

٢. ( ) العنصر المحايد في عملية ضرب الاعداد الحقيقة هو الواحد الصحيح

٣. ( ) مجموعة الاعداد الغير نسبية مغلقة علي عملية الجمع

٤. ( ) العدوان  $\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{7}$  ،  $\sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{5}$  مترافقان

٥. ( ) النظير الضريبي للعدد  $\frac{2}{\sqrt{5}}$  هو  $\frac{2}{\sqrt{5}}$

$$6. (\sqrt[5]{2} \times \sqrt[5]{3}) = \sqrt[5]{2 \times 3}$$

$$7. (\sqrt{3} \times \sqrt{2}) = \sqrt{3 \times 2}$$

٨. ( ) عملية القسمة تجمعية علي ح

٩. ( ) اذا كان  $\sqrt{5} = s$  فأن  $s = \sqrt{5}$

١٠. ( ) اذا كانت طول ضلع مربع  $\sqrt{8}$  فان مساحته تساوي ٨

٢) جد الناتج في ابسط صورة :-

$$\dots = \sqrt{3} \times \sqrt{3} \quad (1)$$

$$\dots = \sqrt{8} \times \sqrt{2} \quad (2)$$

$$\dots = \sqrt{40} \times \sqrt{25} \quad (3)$$

$$\dots = \sqrt{7} \times \sqrt{3} \quad (4)$$

$$\dots = (\sqrt{5} + 7)(\sqrt{5} - 7) \quad (5)$$


$$\dots = \sqrt{12} \div \sqrt{48} \quad (6)$$

$$\dots = \sqrt{2} \div \sqrt{54} \quad (7)$$

$$\dots = \frac{1}{36} \sqrt{ } \times \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{36}} \quad (8)$$

$$\dots = \sqrt{0,04} \times 12,5 \quad (9)$$

$$\dots = \frac{2}{8} \times 20 \times \sqrt{64} \quad (10)$$



ما مساحة شبه المنحرف في الشكل المجاور (11)

٣) حل المعادلات الاتية :-

$$2s - 5 = \sqrt{3} \quad (2)$$

$$5 = 9 - \sqrt{7} \quad (1)$$

#### الدرس الرابع : القيمة المطلقة

١) اكمل العبارات الاتية :-

١) القيمة المطلقة هي عدد الوحدات التي يبعدها العدد الحقيقي  $a$  عن ..... على خط الاعداد ..... ويرمز لها بالرمز .....

$$\dots = | 27 - 6 | \quad (8)$$

$$\dots = | 3 - | \quad (2)$$

$$\dots = | 2 | + | 5 - | - \quad (9)$$

$$\dots = | \frac{\pi}{2} | \quad (3)$$

$$\dots = | \sqrt{7} - 7 | \quad (10)$$

$$\dots = | \sqrt{2} - 1 | \quad (4)$$

$$\dots = | \sqrt{3} - \sqrt{5} | \quad (5)$$

$$\dots = \sqrt[2]{(8-(-))} \quad (6)$$

$$\text{اذا كانت } | s | = \sqrt{11} \text{ فإن } s = \dots \quad (7)$$

- (٢) اجد قيمة س التي تحقق كلا من المعادلات الآتية :

$$9 = 2(s - 5)$$

$$16 = 2s$$

- (٣) أوجد قيمة المقدار في أبسط صورة

### الدرس الخامس : الاسس

- (١) اختر الاجابة الصحيحة :-

$$(1) ( ) \quad 26 \times 36 = 2^6 \times 3^6$$

$$(2) ( ) \quad 2^{-2} \div 2^2 = 2^{-2}$$

$$(3) ( ) \quad 2^{-3} = \frac{1}{2^3}$$

$$(4) ( ) \quad 13 + 15 = 2^{\circ} \times 7^{\circ} \quad (\text{صفر} + 1^{\circ})$$

$$(5) ( ) \quad 2^4 = 4^5$$

$$(6) ( ) \quad 2^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^6$$

- (٧) أحد المعادلات التالية أسيّة

$$(أ) s^2 + 2 = 5 \quad (ب) s^2 = 3 \quad (ج) s = \sqrt[7]{7}$$

$$(8) اذا كان s^2 = 1 ، فان s = 1 ، 2 ، صفر ، -1$$

- (٩) قطر القمر البالغ ٣٤٧٦٠٠٠ م تقريباً يكتب بالصورة العلمية

$$(أ) 10^{10} \times 3476 \quad (ب) 10^{10} \times 347.6 \quad (ج) 10^{10} \times 3476$$

$$(10) ( ) \quad 27 = \frac{1}{3} (27)$$

$$(11) \text{ مكعب طول ضلعه } \sqrt[3]{15} \text{ سم فان حجمه} = (15)^3$$

(٢) جد قيمة ما يلي في أبسط صورة.

$$= \frac{4^3 \times 2^3}{7^3} \quad (١)$$

$$= 2^{-}(3^{-}(2^{-})) \quad (٢)$$

$$= 4(\sqrt[3]{2}) \quad (٣)$$

$$= \frac{1}{2}(0,49) \quad (٤)$$

$$= 10(1 + \sqrt{2}) \times 10(1 - \sqrt{2}) \quad (٥)$$

$$= 12(-\sqrt{3} + 2) \times 12(\sqrt{3} + 2) \quad (٦)$$

$$= 2^{-}\left(\frac{2}{3}\right) \quad (٧)$$

$$= \frac{1}{5}(1.32) \quad (٨)$$

$$= \frac{\frac{2}{3}(4^3)}{5^3} \quad (٩)$$

$$(على صورة أس كسري) = \sqrt[5]{2^7} \quad (على صورة جذر) = \frac{2}{3} \quad (١٠)$$

(٣) جد قيمة س فيما يأتي :-

$$\frac{1}{32} = 2^{1+2s}$$

$$125 = 5^3$$

$$128 = 2^{3-4s}$$

$$81 = \frac{3^3}{s^3}$$



## الدرس الأول : الضرب الديكارتي

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١. ) اذا كان  $A$  ،  $B$  مجموعتان فإن  $A \times B = \{ (s, c) : s \in A , c \in B \}$
  ٢. ) اذا كان  $A = \{ 1, 2 \}$  ،  $B = \{ 5 \}$  فإن  $A \times B = \{ 10 \}$
  ٣. ) إذا كانت  $(s, t) = (2, 3)$  فإن  $s = 2$  ،  $c = 3$
  ٤. ) عدد عناصر حاصل الضرب الديكارتي  $A \times B =$  عدد عناصر  $A \times$  عدد عناصر  $B$
  ٥. ) إذا كانت  $A$  ،  $B$  مجموعتان فإن  $A \times B = B \times A$

(٢) أوجدي  $\{ ٥, ٣, ١ \}$  ، بـ  $\{ ٧, ٢ \}$  ، إذا كان  $\Omega =$

$$\{ \quad \quad \quad \} = \quad \dot{\int} \times \dot{\int} \quad \bullet$$

$$\{ \quad \quad \quad \} = \text{ب} \times \text{أ} \quad \bullet$$

• عدد عناصر  $b \times b$  = ..... .

(٣) جد قيمة س ، ص في كل مما يلي:-

$$\dots = \dots = (s, 7, s) \bullet$$

$$\dots = س \quad (س+٣ ، ص^٢) = (٩ ، ٥) \bullet$$

$$\{ 5, 4 \} = \{ 3, 2, 1 \}, \text{ بـ } 4$$

ضع اشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة فيما يلي :-

$$(\quad) \quad \quad \quad \exists (\varepsilon, \delta) \cdot$$

( )  $\times \vdash \exists ( 2 , 5 )$  •

( ) ب  $\times$  أ  $\in$  ( ٢ ، ٣ ) •

## الدرس الثاني : العلاقة


١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١.١ ) مدى العلاقة هي مجموعة المساقط الأولى للأزواج المرتبة التي تمثل العلاقة.

١.٢ ) مجال العلاقة هو مجموعة المساقط الثانية للأزواج المرتبة المنتمية للعلاقة.

١.٣ ) إذا كانت  $U$  علاقة من  $A$  إلى  $B$  فإن مجال  $U \subseteq A$


١.٤ ) العلاقة على  $A$  هي مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي  $A \times A$



{

• مجال العلاقة المرسوم = { }

• مدى العلاقة  $U = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1)\}$



• الازواج المرتبة للعلاقة الممثلة بيانيا هي { }

٢) إذا كان  $A = \{5, 6, 7\}$  ،  $U = \{(s, c) \in A \times A : s < c\}$  أوجد:-

• على شكل أزواج مرتبة.

• مثل العلاقة السابقة بمخطط سهمي.

• أوجد مجال ومدى العلاقة  $U$ .


٣) لتكن  $A = \{2, 3\}$  ،  $B = \{5, 6, 7, 8\}$  أوجد العلاقات التالية على شكل ازواج مرتبة

•  $U = \{(s, c) \in A \times B : s + c \text{ عدد زوجي}\}$

$\{$   $U = \{ \}$

•  $L = \{(s, c) \in A \times B : s \text{ عامل من عوامل } c\}$


$\{$   $L = \{ \}$



٥) اختر الاجابة الصحيحة :-

- اذا كانت  $A = \{1, 2, 4, 6\}$  ، وكانت علاقة على A حيث  $U = \{(s, c) | s + 2 = c \text{ احد الازواج التالية ينتمي للعلاقة}\}$

(أ)  $\{(2, 4), (2, 6)\}$       (ب)  $\{(2, 6), (4, 6)\}$       (ج)  $\{(4, 6), (2, 6)\}$       (د)  $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (3, 1)\}$



- اذا كان المخطط السهمي المقابل يمثل علاقة على  $A = \{1, 2, 3\}$  فان ع

(أ)  $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$   
 (ب)  $\{(2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$   
 (ج)  $\{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$

- اذا كانت  $A = \{1, 2, 4\}$  ،  $B = \{1, 2, 4\}$  ، علاقة من A الى B  $(s, c) \in U$  حيث  $s = 2c$  فان ع

(أ)  $\{(1, 2), (1, 4), (2, 4)\}$   
 (ب)  $\{(1, 2), (2, 1), (2, 4), (4, 1)\}$   
 (ج)  $\{(2, 1), (2, 4), (4, 1)\}$

### الدرس الثالث : خواص العلاقات

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

- تكون علاقة انعكاسية على المجموعة A اذا كانت  $(s, s) \in U$  لجميع عناصر s ∈ A
- اذا كانت  $(s, c) \in U$  ،  $(c, s) \in U$  فان علاقة انعكاسية.
- علاقه > على مجموعة الاعداد الصحيحة تعتبر علاقه تماثلية.
- العلاقة U =  $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$  علاقه تعدى.
- علاقه التطابق على مجموعة من الاشكال الهندسية هي علاقه تكافؤ.

٢) أكمل :-


- اذا كان  $(3, 4) \in U$  حيث علاقه تماثلية على المجموعة A فان ..... ، ..... ، ..... ∈ U
- تكون العلاقة علاقه تكافؤ اذا كانت ..... و ..... و ..... و .....
- علاقه التعماد على مجموعة المستقيمات في المستوى الديكارتي هي علاقه ..... اما علاقه التوازي فهي .....
- اذا كان ..... ت س =  $\{3, 5, 7\}$  ، علاقه تكافؤ ع ..... اف ..... ف ..... س ..... ان
- ع { (3, 3), (5, 5), ( ) , ( ) , ( ) } .....

٣) اختر الاجابة الصحيحة :-

• العلاقة الانعكاسية على المجموعة  $A = \{3, 4, 5\}$  فيما يلي هي:

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ب) $\{(3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ | أ) $\{(3, 3), (4, 5), (5, 4)\}$ |
| د) $\{(4, 5), (5, 4)\}$         | ج) $\{(5, 3), (4, 5), (3, 4)\}$ |

• العلاقة الممثلة في الشكل المقابل



- |            |             |
|------------|-------------|
| ب) تماثلية | أ) انعكاسية |
| د) تكافؤ   | ج) متعدية   |

• اذا كانت  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  فإن احدى العلاقات التالية غير متعدية

- |   |   |
|---|---|
| ب) $\{(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3), (5, 5)\}$ | أ) $\{(1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ |
| د) $\{(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3)\}$         | ج) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ |

٤) لتكن  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  ،

•  $U = \{s, t\} \times A : s + t = \text{عدد زوجي}$  { اوجد ع على شكل ازواج مرتبة.

$$U = \{ \quad \}$$

• ابحث ما اذا كانت  $U$

- |            |           |
|------------|-----------|
| ب) تماثلية | أ) انعكاس |
| د) تكافؤ   | ج) متعدية |


#### الدرس الرابع : الاقتران

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١. ) الاقتران هو علاقة من  $A$  الى  $B$  تربط كل عنصر من عناصر  $A$  بعنصر واحد فقط من عناصر  $B$
٢. ) كل علاقة هي اقتران.
٣. ) اذا كان  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  فان العلاقة على  $A$  حيث  $U = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$  تعتبر اقتران
٤. ) مدى الاقتران هو مجموعة جزئية من عناصر مجال الاقتران
٥. ) المدى مجموعة جزئية من المجال المقابل


٢) اختر الاجابة الصحيحة :-

• أحد المخططات السهمية التالية يمثل اقتران



• مدى الاقتران في حيث  $Q : A \leftarrow B$  هو

- ب) عناصر المجموعة  $B$
- أ) عناصر المجموعة  $A$
- ج) صور عناصر المجموعة  $A$
- د) عناصر المجموعتين  $A, B$



• قاعدة الاقتران الممثل بالشكل المجاور هي  $Q(s) =$

- أ)  $s^3 + s^2$
- ب)  $s^4 + s^3$
- ج)  $s^3 - s^1$
- د)  $s^1 + s^2$

• اذا كانت  $Q : H \leftarrow H$  ،  $Q(s) = s^3 - s^5$  وكان  $Q(s) = 7$  فان قيمة  $s$  =

- د) ٦٨
- ج) ١٦
- ب) ٥
- أ) ٤

• اذا كان  $A = \{1, 2, 4, 6\}$  ،  $B = \{1, 2, 3, 4\}$  وكان  $Q : A \leftarrow B$  حيث  $Q(s) = \frac{1}{2}s$  اوجد:-

•  $Q$  على شكل ازواج مرتبة.

• مجال ومدى والمجال المقابل للاقتران  $Q$ .

• مثل الاقتران  $Q$  بمخطط سهمي.

٤) جد الناتج :-

• اذا كان  $Q(3) = 0$  وكان  $Q(s) = s^9 - s^1$  اوجد قيمة  $s$

أ) اذا كانت  $S$  هي مجموعة الاعداد الصحيحة وكان  $Q : S \leftarrow S$  بحيث  $Q(s) = s^2$  اوجد مدى الاقتران  $Q$

ب) اذا كان الزوج المرتب  $(s, 25)$  يحقق قاعدة الاقتران  $Q$  ، فما قيمة  $s$  ؟

## الدرس الخامس : أنواع الاقترانات

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١. ) اذا كان مدى الاقتران = مجاله المقابل فانه يعتبر اقتران شامل
٢. ) يكون الاقتران تناظر اذا كان واحد لواحد فقط
٣. ) اذا كان  $s_1 \neq s_2$  وكان  $Q(s_1) = Q(s_2)$  فان الاقتران يكون واحد لواحد
٤. ) كل اقتران شامل هو اقتران تناظر

٢) اختر الاجابة الصحيحة :-

• اذا كانت  $s = \{1, 2, 3, 4\}$   $Q(s) = \{5, 6, 7, 8\}$  فإن الاقتران الذي يكون واحد لواحد هو

- ب)  $\{(1, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8)\}$       أ)  $\{(5, 1), (5, 2), (5, 3), (7, 4)\}$   
ج)  $\{(1, 6), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$       د)  $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7)\}$

• اذا كان  $A = \{1, 2, 3, 4\}$   $B = \{5, 6, 7\}$  فإن أحد الاقترانات التالية من  $A$  إلى  $B$  هو اقتران شامل

- ب)  $\{(2, 6), (3, 6), (4, 6)\}$       أ)  $\{(5, 2), (5, 3), (5, 4)\}$   
ج)  $\{(2, 5), (3, 6), (4, 6)\}$       د)  $\{(7, 4), (6, 3), (5, 2)\}$

• اذا كان  $Q(s)$  اقتران تناظر فان  $Q(s)$  يجب ان يكون اقتراناً  
د) ليس مما ذكر      ج)  $A$  بـ معا      ب) واحد لواحد      أ) شاملا

٣) اذا كان  $A = \{1, 2, 3\}$  ،  $B = \{3, 4, 5\}$  وكان  $Q$  اقتران حيث  $Q : A \rightarrow B$   $Q(s) = s+2$

• اكتب  $Q$  على شكل مجموعة أزواج مرتبة

• اوجد مجال ومدى والمجال المقابل للاقتران  $Q$

• هل  $Q$  اقتران تناظر ولماذا؟

٤) اذا كان  $Q : T \rightarrow T$  حيث  $Q(s) = s^2$  هل  $Q$  اقتران تناظر ولماذا؟

## الدرس السادس : الاقتران الخطى

(ا) اختر الاجابة الصحيحة :-

- اذا كان  $q(s) = 2s + 1$  فان  $q(-1) =$

د) ٣

ج) -١

ب) ٣-

أ) ١

- جميع ما يلي اقترانات خطية ما عدا

د)  $\frac{7}{s}$

ج)  $\sqrt[3]{s+5}$

ب)  $q(s) = \frac{s}{7}$

أ)  $q(s) = s^2 + 2s$

- أي من النقاط التالية تقع على المستقيم  $q(s) = s + 1$

د) (٣ ، ١)

ج) (-١ ، ١)

ب) (١ ، ٠)

أ) (١ ، ٠)

- الصورة العامة للاقتران الخطى هي

ب)  $q(s) = As + B$

أ)  $q(s) = As^2$

د) ليس مما ذكر

ج)  $q(s) = As^2 + B$

- أحد الاقترانات التالية محايده





د)  $q(s) = s$

ج)  $q(s) = 1 - s$

ب)  $q(s) = -s$

أ)  $q(s) = -s$

- أحد الاقترانات التالية اقتران ثابت



- اذا كان  $q(s) = 10$  فإن  $q(3) =$


د) ١٠-

ج) ٣-

ب) ٣

أ) ١٠

٢) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ : -



١. ) اذا كان  $Q(4) = 4$  فان  $Q(s)$  يسمى اقتراناً ثابتاً
٢. ) اذا كان  $Q(s) = 2$  فان  $Q(s)$  يسمى اقتراناً محايضاً
٣. ) الشكل المجاور يمثل اقتراناً محايضاً
٤. ) اذا كان  $Q(s) = 9$  فان  $Q(7) - Q(3) = 0$  صفر
٥. ) الاقتران المحايد يعتبر حالة خاصة من الاقتران الخططي
٦. ) عند تمثيل الاقتران المحايد في المستوى فإنه يصنع زاوية  $45^\circ$  مع محور السينات الموجب

١) مثل الاقترانات التالية :-

$$Q(s) = s + 5 \quad \bullet$$


$$Q(s) = 1 - 2s \quad \bullet$$


$$Q(s) = -4 \quad \bullet$$


## الدرس السابع : تركيب الاقترانات والاقتران النظير

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١. ) ( ✓ ) تركيب الاقتران ونظيره يكافئ اقتران محايد

٢. ) ( ✗ )  $h \circ q(s) = h(q(s))$

٣. ) ( ✗ )  $h \circ q(s) = q \circ h(s)$

٤. ) ( ✗ )  $(k^{-1} \circ k)(s) = s$

٥. ) ( ✗ ) لكي يكون للاقتران نظير يجب ان يكون واحد لواحد فقط

٦) أكمل العبارات التالية :-

• اذا كان  $q^{-1}$  اقتران فان  $q$  يكون اقتران ..... .

{ • اذا كان  $q = \{1, 2, 3, 5, 7\}$  فان  $q^{-1} = \{9, 7, 5, 3, 2\}$

• اذا كان  $q(s) = 2s - 9$  فان  $q^{-1}(s) = ..... .$

• اذا كان  $q(a) = b$  فان  $q^{-1}(b) = ..... .$

•  $(q \circ q^{-1})(3) = ..... .$

٧) اذا كان  $q(s) = 3s + 2$  ،  $h(s) = s^2 - 1$  أوجد

•  $h \circ q(1)$

•  $q \circ h(2)$

•  $q \circ h(s)$

٨) إذا كان  $q = \{1, 3, 4, 5, 2\}$  أوجد  $q^{-1}$  ثم بين هل  $q^{-1}$ -اقتران ام لا مع بيان السبب.

٩) باستخدام قاعدة الاقتران المحايد أوجد  $q^{-1}(s)$  لكل من :-

$$q(s) = s^3$$

$$q(s) = s + 7$$

$$q(s) = 5s - 3$$



### الدرس الأول : المسافة بين نقطتين

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١) (✓) المسافة بين النقطتين  $A(1, 2)$  ،  $B(2, 1)$  هي  $\sqrt{(2-1)^2 + (2-1)^2}$

٢) (✗) تكون النقاط  $A$  ،  $B$  ،  $C$  على استقامة واحدة اذا كانت  $A + B = C$

٣) (✗) المسافة بين النقطتين  $M(1, 3)$  ،  $N(5, 3)$  هي ٤ وحدات.

٤) (✗) المسافة بين النقطتين  $M(5, 7)$  ،  $N(1, 4)$  هي  $\sqrt{(5-1)^2 + (7-4)^2}$

٥) (✓) المسافة بين النقطتين  $(4, 1)$  ،  $(5, 7)$  هي  $\sqrt{(5-4)^2 + (7-1)^2}$

(٦) جد الناتج :-

١. اوجد المسافة بين النقطتين  $A(-4, 2)$  ،  $B(3, 1)$

٢. اذا كانت المسافة بين النقطتين  $(-1, 0)$  ،  $B(5, 0)$  تساوي ١٠ وحدات ، اوجد قيمة  $B$ .

٣) اذا كانت  $A(0, 0)$  ،  $B(3, 0)$  ،  $C(0, 3)$  ، بين نوع  $\triangle ABC$

٤) اذا كان  $AB$  طرفي قطر في دائرة حيث  $A(-1, 3)$  ،  $B(3, -1)$  ، احسب طول نصف قطر الدائرة.

## الدرس الثاني : احداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة

(١) اكمل :-

أ) اذا كانت  $A(s_1, c_1)$  ،  $B(s_2, c_2)$  فان منتصف القطعة المستقيمة

$$AB = \dots \dots \dots$$

ب) اذا كانت  $(\dots, \dots)$  هي منتصف القطعة المستقيمة عل حيت  $(2, 5)$  فإن

$$c = \dots \dots \dots$$

(٢) ضع علامة  $(\checkmark)$  أمام العبارة الصحيحة وعلامة  $(\times)$  أمام العبارة الخطأ :-

١. ) الاحداثي السيني لمنتصف المسافة بين النقطتين  $(2, 3), (1, 5)$  هو  $\frac{3+2}{2}$

٢. ) اذا كانت  $A(-2, -5)$  ن  $(2, 5)$  فان احداثيات منتصف أن هي نقطة الاصل

(٣) جد الناتج :-

أ) اوجد احداثيات النقطة التي تتصرف  $AB$  حيث  $A(-2, 1), B(5, 2)$

ب) اذا كانت  $J(1, 2)$  منتصف المسافة بين النقطة  $A(2, 3)$  والنقطة  $B$  اوجد احداثيات النقطة  $B$

ت) اذا كانت  $J(-1, 3)$  هي احداثيات منتصف  $AB$  حيث  $A(5, s), B(s, -4)$

اوجد قيمة  $s$  ،  $c$

ث) اذا كان الشكل  $ABCD$  متوازي اضلاع اثبت ان النقطة  $M$  هي نقطة تقاطع قطريه

حيث  $A(6, 2), B(3, 0), C(0, 1), D(2, 0)$

### الدرس الثالث : ميل الخط المستقيم

١) اكمل العبارات الآتية :-

١. اذا كان  $A$  (س<sub>١</sub> ، ص<sub>١</sub>) ،  $B$  (س<sub>٢</sub> ، ص<sub>٢</sub>) فان ميل  $AB = \dots$
٢. ميل المستقيم هو ..... الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات
٣. ميل المستقيم الموازي لمحور السينات ..... .
٤. ميل المستقيم العمودي علي محور السينات ..... .
٥. اذا كان المستقيم المار بال نقطتين  $(3, 7), (A, 7)$  يوازي محور الصادات فان  $A = \dots$
٦. ميل المستقيم المار بال نقطتين  $(2, 4), (1, 2)$  ..... .

٢) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطا :-

١. ( ) ميل المستقيم هو ظل الزاوية الموجبة التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور الصادات.
٢. ( ) الاحداثي السيني لأي نقطة تقع علي المستقيم الموازي لمحور الصادات لا تتغير.
٣. ( ) زاوية ميل المستقيم المار بال نقطتين  $(1, 0), (4, 3)$  تساوي  $45^\circ$
٤. ( ) المستقيم المار بال نقطتين  $(1, 9), (2, 9)$  يوازي محور السينات.

٣) جد ميل المستقيم في الحالات التالية :-

١. المار بال نقطتين  $(5, 2), (7, 3)$

٢. المار بنقطة الاصل والنقطة  $(4, -1)$

٣. الذي يصنع زاوية قياسها  $30^\circ$  مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

٤. باستخدام الميل اثبتت ان النقاط التاليّة تقع على استقامة واحدة  
م $(0, 4), N(-1, 1), H(1, 7)$

٥. اذا كان ميل المستقيم المار بال نقطتين  $(-1, 4), (2, ص)$  يساوي ٣ ، اوجد قيمة ص

## الدرس الرابع : معادلة الخط المستقيم

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١. ( ) معادلة المستقيم الذي ميله ٧ وقطعه الصادي ٢ هي  $s = 2s + 7$

٢. ( ) معادلة المستقيم الذي ميله ٢ ويمر بالنقطة  $(s_1, s_1)$  هي  $s = m(s - s_1) + s_1$

٣. ( ) ميل المستقيم  $s = 3s + 5$  هو ٣

٤. ( ) معادلة محو السينات هي  $s = 0$

٥. ( ) اذا كانت النقطة  $(3, b)$  تقع على المستقيم الذي معادلته  $s + 2s = 7$  فان  $b = 13$

-) اختار الاجابة الصحيحة :-

• معادلة المستقيم الذي ميله يساوي -٣ وقطعه الصادي يساوي -٥ هي

أ)  $s - 3s + 5 = 0$   
ب)  $s + 3s - 5 = 0$  صفر

ج)  $3s - s + 5 = 0$   
د)  $3s + s - 5 = 0$  صفر

• في معادلة المستقيم  $7s - s = 2$  ميل المستقيم يساوي

أ) ١  
ب) -١  
ج) ٧  
د) ٧

• المقطع الصادي في معادلة المستقيم  $s + 2s - 4 = 0$  يساوي

أ) ٢  
ب) -٢  
ج) -٤  
د) ٤

• معادلة المستقيم الذي مقطعه الذي مقطعه السيني = ٤ وقطعه الصادي = ٨

أ)  $s = 4s - 8$   
ب)  $s = 8 - 4s$

ج)  $8 = s + 4s$   
د)  $4 = s + 8$

• قيمة  $s$  التي تجعل المستقيم  $s = h - 7$  موازياً لمحور السينات .

أ) ١١  
ب) -٧  
ج) ٧  
د) ٤

• احد النقاط التالية تقع على المستقيم الذي معادلته  $3s - 2s = 6$

أ) (٣، ٢)  
ب) (٠، ٢)  
ج) (٢، ٠)  
د) (٠، ٠)

- جد الناتج : (٣)

١. اوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله -٢ ويمر بالنقطة (٥، ٣).
٢. اوجد معادلة المستقيم الذي يمر بال نقطتين (١١، ٢)، (٥، ١).
٣. اوجد معادلة الخط المستقيم الذي مقطعه السيني = ٣ و مقطعه الصادي = ٢.
٤. اوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله  $-\frac{1}{3}$  ويقطع محور الصادات عند النقطة (٢، ٥).
٥. اوجد الميل والمقطع الصادي للمستقيم الذي معادلته  $5s + 4c = 8$ .
٦. اذا كانت النقطة (١، ٢) تقع على المستقيم الذي معادلته  $as + 2c = 5$  فما قيمة  $a$ ؟
٧. اوجد معادلة الخط المستقيم الموازي لمحور الصادات ويمر بالنقطة (-٢، ٧).
٨. اوجد معادلة الخط المستقيم الموازي لمحور السينات ويمر بالنقطة (١، ٣).

## التوازي والتعماد

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١. ) يتواءزى المستقيمان اذا تساوى ميلاهما
٢. ) المستقيم الذي ميله  $\frac{2}{3}$  يعادل المستقيم الذي ميله  $\frac{3}{2}$
٣. ) ميل المستقيم الذي يوازي المستقيم  $2s + c = 5$  هو ٢
٤. ) المستقيمان  $s = 5$  ،  $c = 5$  متعامدان .

٢) أكمل العبارات الآتية :-

١. اذا توازي مستقيمان في المستوى فان ميلاهما ..... .
٢. اذا كان المستقيمان متعامدان فان حاصل ضرب ميلاهما ..... .
٣. ميل المستقيم الذي يعادل المستقيم المار بال نقطتين (١، ٥) ، (٧، ٢) ..... .
٤. ميلا المستقيمين العموديين على مستقيم ثالث في المستوى ..... .

٣) اختر الاجابة الصحيحة :-

• المستقيم الذي معادلته  $c = 3s + 5$  يتعامد مع المستقيم الذي معادلته

ب)  $c = 3s - 2$       أ)  $c = 3s + 5$

د)  $c = -s + 5$       ج)  $c = 2s - 3$

• المستقيم المار بال نقطتين أ (٢، ١) ب (٥، ١) عمودي على المستقيم

ب)  $c = 2s - 1$       أ)  $c = 2s + 5$

د)  $c = -\frac{1}{2}s + 2$       ج)  $c = \frac{1}{2}s - 3$

• يكون المستقيمان اللذان ميلاهما  $m_1$  ،  $m_2$  متوازيان اذا كان

ب)  $m_1 > m_2$       أ)  $m_1 < m_2$

د)  $m_1 = m_2$       ج)  $m_1 \times m_2 = 1$

• حاصل ضرب ميلى المستقيمين المتعامدين

ب) ١      أ) صفر

د) ٢      ج) ١ -

- جد الناتج : ٤

١. معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ، ٤) ويواري المستقيم  $6s + 3c = 1$

٢. معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة (٢ ، ٣) وعمودي على المستقيم  $s = 2s + 5$

٣. بين ان المستقيم المار بالنقطتين (٢ ، ١)، (٤ ، ٥) يعادل المستقيم المار بالنقطتين (-٣، ٥)، (-٤، ١)

٤. اثبت ان المستقيم المار بالنقطتين (٢، -١)، (١٢، ٣) يوازي المستقيم  $2s - 5c = 1$  صفر

٥. اوجد قيمة ص حيث أب // ج د علما بان أ(٣ ، ٥) ، ب(٤ ، ٧) ، ج(٠٠ ، ٤) ، د(٢ ، ص)

٦. اوجد معادلة العمود المنصف للقطعة المستقيم ج د حيث ج(-٣ ، ١) ، د(٣ ، ٧).



## الدرس الاول : الجداول التكرارية

١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١. (✗) طول الفئة = عدد الفئات ÷ المدى.
٢. (✓) اذا كان المدى يساوي صفر فان جميع القيم متساوية.
٣. (✓) اذا كان جميع القيم سالبة فان المدى يكون سالب
٤. (✗) الفئة هي مجموعة تحتوي عددا من القيم المتقاربة.
٥. (✓) الحد الأعلى للفئة = الحد الأدنى + طول الفئة - ١
٦. (✗) طول الفئة (٤٩ - ٤٠) هو ١٠

٢) تمثل البيانات الآتية علامات (٣٠) طالبا في الصف الثامن في مادة الرياضيات

٢٣	١٩	٢٩	٢١	١٧	١٣	١٠	٢٣	٢٢	٢٠	١٦	١٤
٢٤	٢٥	٢٤	٢٨	٢٠	١٨	٢٩	٢٥	٢١	٢٢	٢٥	٢٧
							١٧	٢١	٢٢	١٧	٢٢

الجدول مكون من ٥ فئات.

اجب عن الاسئلة الآتية:-

• مدى البيانات = .....

• طول الفئة = .....

أكمل الجدول الآتي:-

المجموع	٢٩ - ٢٦	٢٥ - ٢٢	٢١ - ١٨	١٧ - ١٤	١٣ - ١٠	الفئات
						الاشارات
						العدد

- الفئة التي عدد طلبها ٤ هي ..... •
- عدد الطلاب الذين تتراوح علاماتهم بين ( ١٤ - ١٧ ) هو ..... •
- عدد الطلاب الذين حصلوا على اقل من ١٨ هو ..... •
- عدد الطلاب الذين حصلوا على ٢٢ فاكثر هو ..... •

## الدرس الثاني : التمثيل البياني للجداول التكرارية ذات الفئات.

- (١) ضع علامة ( ✓ ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( ✗ ) أمام العبارة الخطأ :-
١. ) ( الحد الفعلي الأدنى = الحد الأدنى + ٥,٥ )
  ٢. ) ( الحد الفعلي الأعلى = الحد الأعلى - ٥,٥ )
  ٣. ) ( في المضلع التكراري يكون مركز الفئة هو المحور الافقى والتكرار هو المحور الصادى . )
  ٤. ) ( في المدرج التكراري تكون الحدود الفعلية على المحور الافقى والتكرارات على المحور الصادى. )
  ٥. ) ( مركز الفئة ( ٢٠ - ٢٥ ) يساوى ٢٥ - ٥ = ٢٠ )
  ٦. ) ( التكرار المتجمع الصاعد هو مجموع كل تكرار مع جميع التكرارات التي تسبقه. )

### ٢) اختر الإجابة الصحيحة:-

١. المدى لمجموعة القيم ١٢، ٣، ٧، ٢ هو  
 أ) ٧      ب) ١٠      ج) ١٢      د) ١٤
٢. عند رسم المضلع التكراري يكون على المحور الافقى.  
 أ) التكرار      ب) الحدود الفعلية      ج) الفئات      د) مركز الفئة.
٣. مجموع كل تكرار من التكرارات التي تسبقه.  
 أ) التكرار النسبي      ب) التكرار التراكمي      ج) طول الفئة      د) مركز الفئة.
٤. مركز الفئة التي حدودها ( ٥٠ - ٦٠ ) يساوي  
 أ) ٥٥      ب) ١١٠      ج) ١٠      د) ٥٤
٥. اذا كانت الفئة هي ( ١٠ - ٢٠ ) فان جميع ما يلي صحيح ماعدا.  
 أ) مركز الفئة هو ١٥      ب) طول الفئة يساوي ١٠  
 ج) الحد الأدنى للفئة هو ١٠      د) الحد الأعلى الفعلي للفئة هو ٢٠,٥

٣) أ) الجدول التالي يمثل درجات ٣٠ طالب في مادة الرياضيات

٢٠ - ١٦	١٥ - ١١	١٠ - ٦	٥ - ١	فئات
١٠	٩	٧	٤	تكرار
الحدود الفعلية للفئات				الحدود الفعلية للفئات

مثل البيانات السابقة بمدرج تكراري

ب) الجدول التالي يبين التوزيع التكراري لأعمار ٢٥ عامل في المصنع .

٤٤ - ٤٠	٣٩ - ٣٥	٣٤ - ٣٠	٢٩ - ٢٥	٢٤ - ٢٠	فئات الاعمار
٢	٦	٨	٥	٤	النكرار
					مراكز الفئات

**مثل البيانات السابقة بطريقة :-**

٢) المنحني التكراري.

١) المُضْلَعُ التَّكْرَارِيُّ

ج) الجدول التالي يبين اوزان ٣٠ طفل بالكيلو جرام.

١٨ - ١٦	١٥ - ١٣	١٢ - ١٠	٩ - ٧	٦ - ٤	الفئة
٣	٨	٤	١٠	٥	الوزن

١) مثل الاوزان بالمنحنى المتجمع الصاعد

٢) اوجد عدد الاطفال الذين تقل اوزانهم عن ١٣ كيلو جرام .

٣) اوجد عدد الاطفال الذين تزيد اوزانهم عن ١٥,٥ كيلو جرام .

الفئات	التكرار		
	٥	٦ - ٤	
	١٠	٩ - ٧	
	٤	١٢ - ١٠	
	٨	١٥ - ١٣	
	٣	١٨ - ١٦	

### **الدرس الثالث : مقاييس النزعة المركزية للجداول التكرارية**

- ١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ : -

١٠) الوسط الحسابي لمجموعة من القيم = مجموع القيم ÷ عددها

٢٠: ( ) الوسط الحسابي للقيم ١٠ ، ١٢ ، ١١ ، ٩ ، ٨ يساوى ١١

٣. ) الوسيط هو قيمة يكون عدد القيم التي تسبقها مساوى لعدد القيم التي تليها بعد ترتيبها

٤. ( ) رتبة الوسيط = مجموع التكرارات + ٢

٥. ( ) المنوال للجداول التكرارية = مركز الفئة الأكثر تكرارا

٦. ) الفئة الوسيطية هي الفئة التي يوجد فيها الوسيط

٧. ) يوجد متواز للقيم ٧ ، ٧ ، ٧ ، ٧ ، ٧ .

٢) اختر الاجابة الصحيحة .

١. جميع ما يلي من مقاييس النزعة المركزية ما عدا

- أ) الوسط الحسابي      ب) الوسيط      ج) الانحراف المعياري      د) المنوال

٢. الوسيط لمجموعة القيم  $7, 2, 8, 5$  يساوي

- أ) ٥      ب) ٦      ج) ٧      د) ٥,٥

٣. اذا كان مجموع التكرارات يساوي ١٨ فان رتبة الوسيط تساوي

- أ) ٩      ب) ٢٠      ج) ١٨      د) ١٦

٤. اذا كان مجموع  $(س \times ت) = 60$  وكان مجموع التكرارات يساوي ١٠ فان الوسط الحسابي يساوي

- أ) ٧٠      ب) ٥٠      ج) ٦      د) ٣٠

٥. خمسة اعداد وسطها الحسابي ٢٠ فان مجموع هذه الاعداد يساوي

- أ) ٤      ب) ٢٠      ج) ٢٥      د) ١٠٠

٦. اذا كان الوسط الحسابي للقيم  $3, 4, س, 7$  يساوي ٥ فان س =

- أ) ٥      ب) ٦      ج) ٧      د) ٨

٧. القيمة الاكثر تكرارا من بين القيم تسمى

- أ) المدى      ب) المنوال      ج) الوسيط      د) الوسط الحسابي

٨. المنوال لمجموعة القيم  $7, 7, 3, 9, 3, 6, 6$  هو

- أ) ٦      ب) ٣      ج) ٧      د) ٩

٣) لديك القيم التالية  $10, 8, 6, 1, 2, 8, 5$

- احسب:-

- الوسط الحسابي
- الوسيط
- المنوال

٤) الجدول التالي يمثل درجات ٣٠ طالب في مادة الرياضيات

الفئة	٤ - ٠	٩ - ٥	١٤ - ١٠	١٩ - ١٥
الفئات	التكرار	٦	١٢	٨

• احسب الوسط الحسابي .

الفئات	٤ - ٠	٩ - ٥	١٤ - ١٠	١٩ - ١٥	المجموع
التكرار (ك)	٤	٦	١٢	٨	٣٠
مراكز الفئات ( س )	٤ - ٠	٩ - ٥	١٤ - ١٠	١٩ - ١٥	المجموع
.....	.....	.....	.....	.....	$\bar{s} = \text{.....}$

• احسب الوسيط .

الفئات	٤ - ٠	٩ - ٥	١٤ - ١٠	١٩ - ١٥	المجموع
الحدود الفعلية العليا	٤	٦	١٢	٨	٣٠
التكرار (ك)	٤ - ٠	٩ - ٥	١٤ - ١٠	١٩ - ١٥	المجموع
.....	.....	.....	.....	.....	$\text{رتبة الوسيط} = \text{.....}$

• احسب المتوسط .

## الدرس الرابع : الانحراف المعياري

١) اختر الاجابة الصحيحة .

١. أحد المقاييس التالية يعتبر من مقاييس التشتت

د) الانحراف المعياري      ج) المنوال      ب) الوسيط      أ) الوسط الحسابي

٢. الجذر التربيعي لمجموع حاصل ضرب التكرارات في مربع انحراف مراكز الفئات عن الوسط الحسابي مقسوما على مجموع التكرارات هو

د) ليس مما ذكر      ب) الانحراف المعياري      ج) التباين      أ) الوسط الحسابي

٣. من مقاييس التشتت

د) كل ما سبق      ج) التباين      ب) المدى      أ) الانحراف المعياري

٤) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :-

١. ) اذا كانت قيمة الانحراف المعياري لمجموعة من البيانات تساوي صفرًا فهذا يعني ان القيم متساوية

٢. ) يمكن ان تكون قيمة الانحراف المعياري سالبة

٣. ) الانحراف المعياري هو مجموع حاصل ضرب التكرارات في مربع انحراف مراكز الفئات عن الوسط الحسابي مقسوما على مجموع التكرارات

٥) يمثل الجدول التكراري التالي اعمار ١٠ أشخاص أوجدي الانحراف المعياري

فئات الاعمار	النكرار (ت)	مركز الفئة (س)	س × ت	$(س - \bar{س})^2 \times ت$	$(س - \bar{س})^2$	$\bar{s}$
	٢	٧	١٤			٩-٥
	٣					١٤-١٠
	٤					١٩-١٥
	١					٢٤-٢٠
	١٠					المجموع

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (s - \bar{s})^2}{n}}$$

$$\bar{s} = \frac{\sum st}{\sum t}$$

٤) اذا كان الجدول التكراري التالي يمثل درجات ٢٠ طالبة في امتحان الرياضيات اوجد الانحراف المعياري للجدول التكراري.

الفئات	٨-٦	٥-٣	١١-٩	١٤-١٢	١٧-١٥	٢٠-١٨
التكرار	٣	٤	٧	٣	٢	١

الفئات	التكرار (ت)	س	س × ت	(س - س̄) <sup>٢</sup>	(س - س̄) × ت
المجموع					

$$\dots = \sigma \quad \dots = \bar{s}$$

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح