

1

الوحدة الأولى

عمليات حيوية في الخلية

Processes in the cell



كيف تحصل الغزلان على الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات
الحيوية والنجاة من الافتراس؟

الوحدة الاولى - الفصل الاول : تدفق الطاقة


اولا : الاسئلة خلال المحتوى

سؤال صفحة (٦) : كمية الطاقة = ٢٩.٢ Kcal

النشاط التمهيدي صفحة(٦) : ١- تتكون البلاستيدة من : غشاء خارجي، غشاء داخلي، الحيز بين الغشائي، ثايلاكويد، غرانم، ستروما.

٢- تتم عملية البناء الضوئي في الثايلاكويد و الستروما .

٣- رسم تخطيطي للبلاستيدة :



نشاط صفحة(٧) : ١- انواع التفاعلات : أ-تفاعلات ضوئية . ب- تفاعلات لاضوئية (حلقة كالفن)

٢-المواد اللازمة:أ-في التفاعلات الضوئية نحتاج الى الضوء، صبغة الكلوروفيل، الماء، ADP ، $NADP^+$.

ب-التفاعلات اللاضوئية نحتاج الى : CO_2 و $NADPH$ و ATP .

٣-المواد الناتجة : أ-في التفاعلات الضوئية ينتج : O_2 و $NADPH$ و ATP

ب-التفاعلات اللاضوئية ينتج : $G3P$ و ADP و $NADP^+$

٤-تحدث التفاعلات الضوئية في الثايلاكويد اما التفاعلات اللاضوئية فتحدث في الستروما .

سؤال صفحة(٨) : لان صبغة الكلوروفيل لا تمتص (تعكس) موجات اللون الاخضر، فيظهر لونها اخضرا .

اسئلة النشاط(الشكل ٤) صفحة (٨) : ١- يتم امتصاص موجات الضوء المرئي ما عدا الخضراء.. ٢-توجد صبغة الكلوروفيل الخضراء في الثايلاكويد.

سؤال صفحة (٩): وظيفة مركز التفاعل في النظام الضوئي : اطلاق الكترونات منشطة (غنية بالطاقة) .

اسئلة النشاط (الشكل ٦) صفحة (٩-١٠) :

١- تمتص الجزيئات الصبغية في النظام الضوئي الثاني الموجات الضوئية؛ ما يسبب انتقال الإلكترونات إلى مستوى طاقة أعلى في جزيء الصبغة الواحدة، بعد ذلك تنتقل طاقة الإلكترونات من جزيء كلوروفيل إلى آخر حتى تصل مركز التفاعل ليتم تنشيطه ليصبح مانحاً قوياً للإلكترونات.

٢- جزيئا الكلوروفيل a في مركز التفاعل .

٣- تعتبر مانحة بشكل قوي للإلكترونات بعد امتصاص الطاقة الضوئية بواسطة الاصباغ، وبالتالي اطلاق الإلكترونات منشطة نحو المستقبل الإلكتروني الأولي .

٤- يتم من خلال تحلل الماء تعويض الإلكترونات التي يفقدها مركز التفاعل في النظام الضوئي الثاني.

٥- يتم ضخ ايونات الهيدروجين (H^+) الناتجة من تحلل الماء الى تجويف الثايلاكويد عبر غشاء الثايلاكويد ليصبح تجويف الثايلاكويد موجبا فتندفع H^+ عبر انزيم بناء ATP (ATP synthase) الموجود في غشاء الثايلاكويد مستخدما طاقة الإلكترونات التي تنتقل من ناقل الى اخر في سلسلة نقل الإلكترون التي تربط بين النظاميين الضوئيين و بالتالي يتم استخدام هذه الطاقة في ربط ADP مع مجموعة فوسفات لتكوين ATP كما في المعادلة الآتية :




٦-نواتج المسار الإلكتروني اللاحقي : O_2 و NADPH و ATP

٧-يتم ذلك بطريقتين :



أ-انتاج ATP :

ب-انتاج جزيئات NADPH : يختزل $NADP^+$ الى NADPH كما في المعادلة الآتية :



٨-تم اكتشاف النظام الضوئي الأول قبل النظام الضوئي الثاني لذلك اعتبر هو الأول، وبما ان النظام الضوئي الثاني يمتص موجات ضوئية بطول 680 نانومتر و النظام الضوئي الأول يمتص موجات ضوئية بطول 700 نانومتر ، تم ترتيب الثاني ليكون في بداية المسار.

سؤال صفحة (١٢) :

من حيث	المسار اللاحقي	المسار الحلقي
النظام الضوئي المشارك	الاول والثاني	الاول فقط
النواتج	O_2 ، $NADPH$ ، ATP	ATP فقط
تعويض الالكترونات	النظام الضوئي الثاني يعوض النظام الضوئي الاول.	لا يوجد تعويض للالكترونات
مستقبل الالكترون الاخير	$NADP^+$	لا يوجد مستقبل للالكترونات

سؤال صفحة (١٦):

***اثر شدة الضوء:**يزداد معدل البناء الضوئي مع الزيادة في شدة الضوء، الى ان يتم الوصول الى نقطة التشبع الضوئي والتي يثبت عندها معدل البناء الضوئي، بسبب وصول التفاعلات الى حد التشبع في امتصاصها للطاقة الضوئية .

***اثر تركيز ثاني اكسيد الكربون:** يزداد معدل البناء الضوئي مع الزيادة في تركيز CO_2 ، الى ان يتم الوصول الى حد معين والتي يثبت عندها معدل البناء الضوئي.

***اثر درجة الحرارة :**يزداد معدل البناء الضوئي مع الزيادة في درجة الحرارة الى ان يتم الوصول الى درجة الحرارة المثلى والتي تمثل درجة الحرارة التي يكون عندها معدل البناء الضوئي اعلى ما يمكن ، وبعدها ومع الاستمرار في الزيادة في درجة الحرارة يكون التأثير سلبا على معدل البناء الضوئي حيث ينخفض بشكل ملحوظ بسبب تحلل المواقع النشطة في الانزيمات الخاصة بالبناء الضوئي ويتوقف بذلك البناء الضوئي .

التفسير : ان هذه العوامل يجب ان تتوفر جميعها في حدودها المثلى كي يحدث البناء الضوئي ، وان غياب أي عامل او عدم توفره في حدوده المثلى (حتى لو توفرت جميع العوامل الاخرى) سيتوقف البناء الضوئي ، ويسمى هذا العامل بالعامل المحدد للتفاعل.

اسئلة النشاط التمهيدي صفحة (١٦) :

١-يتكون الميتوكوندريون من : الغشاء الخارجي، الغشاء الداخلي، الحيز بين الغشائي، الاعراف، رايبوسومات حرة، الحشوة.

٢-يساعد ذلك في انتاج اعداد مناسبة من الميتوكوندريون حسب نشاط الخلية ويتم ذلك بشكل سريع دون الرجوع للنواة .

٣-انتاج الطاقة من خلال تحليل المركبات العضوية عن طريق عمليات التنفس الخلوي.

٤-مقارنة بين الميتوكوندريون و البلاستيدة:

***البلاستيدة : أ-التركيب:**

١-الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي وبينهما حيز يعملان على تنظيم تبادل المواد داخل البلاستيدة وخارجها . وتحتوي على صفائح غشائية تحتوي على صبغة الكلوروفيل وصبغات اخرى مثل الصبغة الصفراء

والبروتينية و العديد من الانزيمات والبروتينات وتسمى بالثايلاكويد ، تترتب الاقراص فوق بعضها لتعطي ما يسمى بالغرانم

ج. الستروما (اللحمية) وهو السائل الذي يملئ الحيز الداخلي للبلاستيدة ، ويحتوي على حبيبات نشا و رايبوسومات وبروتينات وانزيمات بالاضافة الى DNA ، RNA

ب-الوظيفة: تثبيت الطاقة الضوئية واستخدامها في انتاج مركبات عضوية عن طريق المركب G3P

***الميتوكوندريون: أ-التركيب:**

غشاءان ، خارجي مستو و داخلي متعرج على شكل انثناءات اصبعية تسمى الاعراف

ويحيط الغشاء الداخلي بمنطقة داخلية تسمى الحشوة التي تحتوي كميات كبيرة من الانزيمات والبروتينات

والرايبوسومات و DNA ، RNA

ب-الوظيفة: تحرير الطاقة من المركبات العضوية من خلال التنفس الخلوي.

سؤال صفحة (١٨) :

أ-اذا توفر الاكسجين فان البيروفيت ينتقل من السيتوسول الى حشوة الميتوكوندريون عبر بروتين ناقل فيتحول الى مركب اسيتل مرافق الانزيم-أ، ويرافق ذلك انطلاق جزيئ CO_2 وجزيئ $NADH$ ويلزم ذلك مرافق الانزيم-أ .

ب-المواد الداخلة: $2NAD^+$ ، ٢ بيروفيت ، ٢ مرافق الانزيم-أ .

المواد الناتجة: $2NADH$ و $2CO_2$ و ٢ اسيتل مرافق الانزيم-أ

سؤال صفحة (١٨) : اخر سطرين (حلقة كريس) .. لماذا ؟

لأعادة ربط الاسيتل مرافق الانزيم-أ ، واستمرار حلقة كريس وبالتالي تحرير الطاقة من الروابط الكيميائية .

سؤال فرع (ج) صفحة (١٩) : لان تحلل جزيء الغلوكوز ينتج عنه "٢" بيروفيت والتي تتحول الى "٢" اسيتل مرافق الانزيم-أ، وعند دخولها الى حلقة كريس تحتاج لدورتين كي تتحلل .

سؤال صفحة(١٩): $12 CO_2$ ، $18 NADH$ ، $6 FADH_2$ ، $6 ATP$

سؤال صفحة (٢١) :

المرحلة	NADH	FADH ₂	CO ₂	ATP بشكل مباشر	ATP في سلسلة نقل الإلكترون
التحلل الغلايكولي	٢	—	—	٢	٦
من بيروفيت الى استيل مرافق الانزيم-أ	٢	—	٢	—	٦
حلقة كريس	٦	٢	٤	٢	٢٢
المجموع الكلي (٣٨)	—	—	—	٤	٣٤

اسئلة النشاط(الشكل صفحة ٢٢) :

١-غلوكوز و اكسجين . ٢-غلوكوز و اكسجين .

٣-نواتج البناء الضوئي تعتبر متفاعلات في التنفس الخلوي وهذا يدل على التكامل بينهما.

٤- $NADP^+$: انزيم مختزل في النظام الضوئي الاول في البناء الضوئي حيث يختزل الطاقة الموجودة في الإلكترونات لينتج $NADPH$ اما NAD^+ فانه يختزل الطاقة الموجودة في الإلكترونات خلال تحلل المركبات العضوية في عملية التنفس لينتج $NADH$.

٥-السايتوكرومات (سلسلة نقل الإلكترون) .

ثانيا : اسئلة الفصل الاول (الصفحات ٢٣-٢٤-٢٥)

السؤال الاول :

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥
رمز الاجابة	ج	ب	ج	د	ب

السؤال الثاني :

أ-صبغة الكلوروفيل الموجودة في اوراق وساق الملوخية .

ب- التغيرات التي تحدث عند سقوط اشعة الشمس على النظام الضوئي :

(ملاحظة :تشتمل الاجابة على المسار الالكتروني اللاحقي و المسار الالكتروني اللاحقي ، " هذا السؤال لتوضيح مدى

تمكن الطالب من تسلسل المسار الالكتروني اللاحقي و المسار الالكتروني الحلي)

اولا :تفاعلات المسار الالكتروني اللاحقي **Non cyc lic flow** .

١-تمتص الجزيئات الصبغية في النظام الضوئي الثاني الموجات الضوئية، مما يسبب انتقال الإلكترونات الى مستوى طاقة اعلى في جزيء الصبغة، وتفقد طاقتها التي تنتقل من جزيء الى اخر حتى تصل الى مركز التفاعل مما يؤدي الى تنشيط الإلكترونات فيه مركز فيصبح مانحا قويا للإلكترونات .

٢-تمر هذه الإلكترونات المحملة بالطاقة الى مستوى اعلى من الطاقة حتى تصل الى مستقبل الإلكترونات الاول، والذي له جاذبية قوية للإلكترونات.

٣-نتيجة لاستمرار امتصاص الضوء يعمل انزيم خاص في ثايلاكويد النظام الضوئي الثاني على فصل جزيئات الماء حسب المعادلة الاتية :



وبالتالي تزويد مركز تفاعل النظام الضوئي الثاني بالإلكترونات واحدا تلو الآخر، وترتبط ذرات الاكسجين معا مكونة جزيئات اكسجين تنطلق الى الجو كناتج نهائي عن البناء الضوئي.

٤- تنتقل الإلكترونات المنشطة من المستقبل الاول عبر سلسلة من النواقل البروتينية حتى تصل الى السيتركروم والذي يتم من خلاله بناء جزيئات ATP.

٥- يتم بناء جزيئات ATP السيتركروم كما يلي :

يتم ضخ ايونات الهيدروجين (H^+) الناتجة من تحلل الماء الى تجويف الثايلاكويد عبر غشاء الثايلاكويد ليصبح تجويف الثايلاكويد موجبا فتندفع H^+ عبر انزيم بناء ATP (ATP synthase) الموجود في غشاء الثايلاكويد مستخدما طاقة الإلكترونات التي تنتقل من ناقل الى اخر في سلسلة نقل الإلكترون التي تربط بين النظامين الضوئيين و بالتالي يتم استخدام هذه الطاقة في ربط ADP مع مجموعة فوسفات لتكوين ATP كما في المعادلة الاتية :




* وهذه احدى الطرق التي يتم من فيها تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية.

٦- بعد ذلك تصل الإلكترونات للنظام الضوئي الاول وقد استنفذت طاقتها ليتم اعادة تنشيطها من جديد من خلال الجزيئات الصبغية في النظام الضوئي الاول والتي تمتص الموجات الضوئية والتي مما يتسبب في انتقال الإلكترونات الى المستقبل الأولي.

٧- تستمر الإلكترونات في انتقالها من ناقل لآخر في سلسلة نقل الإلكترون حيث تمر في عمليات اكسدة و اختزال تحتصل بالانزيم مختزل $NADP^+$ في النظام الضوئي الاول .

٨- وبالتالي يختزل $NADP^+$ الى $NADPH$ كما في المعادلة الاتية :




* وهذه طريقة اخرى يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية .

ثانيا :المسار الالكتروني الحلقي (Cyclic Electron Flow) .

تصل الإلكترونات الى مركز التفاعل في النظام الضوئي الاول وتكون قد استنفذت طاقتها ليتم اعادة تنشيطها من خلال الاصباغ التي تمتص الطاقة الضوئية ومن ثم تنتقل الى المستقبل الاول في النظام الضوئي الاول ثم الى سلسلة نقل الإلكترون ليتم انتاج جزيئات حاملات الطاقة (ATP) فقط .

ج-استخدم موجات الضوء الاحمر و الازرق لان الاصباغ تمتصها بكفاءة عالية فيزداد معدل البناء الضوئي.

السؤال الثالث: أ- (الاجابة تكون من خلال الكتابة على شكل لمكان استخدام ATP و NADPH)



ب-لانه يتم استخدام 5 G3P في اعادة تصنيع مركب رايبولوز ثنائي الفوسفات كي تستمر الحلبة بالعمل ويتبقى جزيء واحد فقط G3P يستخدم في تصنيع المركبات العضوية ، ومنها الغلوكوز .


ج- ١- (١٢) ٢- (٢٤) ٣- (١٢) ٤- (٢٤)

السؤال الرابع:

أ-تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية واختزالها في جزيئات حاملات الطاقة (NADPH و ATP) و انتاج الاكسجين .
ب-يتم الرجوع للمسار الالكترونى الحلقى صفحة (١١) ورسمه .

السؤال الخامس :

أ- نعم ، زيادة الضوء الممتص يعني زيادة معدل البناء الضوئي بالتالي زيادة في الطول .
ب-



ج- *اثر شدة الضوء: يزداد معدل البناء الضوئي مع الزيادة في شدة الضوء، الى ان يتم الوصول الى نقطة التشبع الضوئي والتي يثبت عندها معدل البناء الضوئي، بسبب وصول التفاعلات الى حد التشبع في امتصاصها للطاقة الضوئية وبالتالي يزداد طول الشجرتين اعتمادا على نسبة شدة الضوء التي يتعرض لها النبات فالنبات الذي يتعرض الى ٨٠% من شدة الضوء يكون معدل طوله اكبر من معدل طول النبات الذي يتعرض الى ٣٥% .

السؤال السادس :

تبدأ حلقة كريس بتفاعل جزيئ اسيتل مرافقة الانزيم-أ مع مركب رباعي الكربون (٤C) يسمى اوكسالواسيتيت، لينتج مركب سداسي الكربون (٦C) يسمى حمض السيترت، حيث يمر بعدة مراحل لاعادة بناء الاوكسالواسيتيت .

لينتج : $NADH$ ٣ ، CO_2 ٢ ، $FADH_2$ ١ ، ATP ١

السؤال السابع : (المراحل : ١- التحلل الغلايكولي. ٢- تحول بيروفيت الى اسيتل مرافق الانزيم-أ - ٣- حلقة كريس. ٤-

سلسلة نقل الالكترون) . المقارنة حسب الجدول الاتي :

اسم المرحلة	النواتج كما ونوعا
التحلل الغلايكولي	٢ بيروفيت ، $NADH$ ٢ ، ATP ٢ ، H_2O ٢
تحول بيروفيت الى اسيتل مرافق الانزيم أ	٢ اسيتل مرافق الانزيم-أ ، $NADH$ 2 ، CO_2 ٢
حلقة كريس	$NADH$ ٦ ، CO_2 ٤ ، $FADH_2$ ٢ ، ATP ٢
سلسلة نقل الالكترون	H_2O ، ATP ٣٤

السؤال الثامن :

من حيث	التنفس الهوائي	التخمير
الكائنات التي تحدث فيها	الكائنات التي تعتمد على الاكسجين مثل الانسان	خلايا العضلات بغياب الاكسجين البكتيريا و الخميرة
عدد ATP الناتجة من تحلل جزيئ واحد غلوكوز	٣٨	٢
المستقبل الالكتروني الاخير	O_2	البيروفيت في التخمير اللبني/ و اسيتالدهايد في التخمير الكحولي

السؤال التاسع :

أ-يحدث تخمر لبني : راجع الشكل (أ-١٦) صفحة (٢٢)

ب-يحدث فيها تخمر كحولي : راجع الشكل (ب-١٦) صفحة (٢٢)

السؤال العاشر :



معادلة البناء الضوئي



معادلة التنفس الخلوي

من خلال المعادلتين نستنتج ما يلي :

- ١- نواتج عملية التنفس هي مواد داخلة (متفاعلة) في عملية البناء الضوئي ، ونواتج عملية البناء الضوئي هي مواد متفاعلة في عملية التنفس الخلوي.
- ٢- في كلتا العمليتين يتم استخدام سلسلة نقل الإلكترون لإنتاج ATP.
- ٣- مساعد الانزيم NAD⁺ في التنفس و مساعد الانزيم NADP⁺ في البناء الضوئي لهما نفس التركيب تقريبا والوظيفة.
- ٤- CO₂ يربط بين حلقة كريس وحلقة كالفن .

السؤال الحادي عشر : تقوم مادة السيانييد بالارتباط مع السايكروكرومات مما يؤدي الى توقف عملية نقل الالكترونات، وبالتالي تتوقف عملية انتاج (ATP) فتحدث الوفاة.

السؤال الثاني عشر : وذلك بسبب حدوث عملية التخمر اللبني بواسطة بعض انواع البكتيريا والتي تؤدي الى انتاج حمض اللبن والذي يضفي هذه النكهة على اللبن و المخلات .

الوحدة الاولى -الفصل الثاني : من الجين الى البروتين

اولا : الاسئلة خلال المحتوى (الانشطة...)

اسئلة النشاط (١) صفحة (٢٧) :

١-٦٤ كودونا.

٢- (البدا AUG) (الايقاف UAA و UAG و UGA) ٣- ميثيونين والترينوفان .

٤- البرولين يشفر باكثر من كودون مثلا CCU/CCC/CCA/CCG ولكن CCU لا يمكن ان يشفر الا برولين فقط. (او أي مثال اخر)

٥- باختلاف نوع النيوكليوتيدات وترتيبها .

سؤال صفحة (٣٥) :

نعم يمكن ذلك حسب حاجة الخلية. مثال ذلك : في الخلايا الافرازية كالغدد مثلا يرتبط بنفس النسخة من mRNA اكثر من

رايبوسوم وتسمى "عديد الرايبوسوم" حيث تنتج عدة نسخ من البروتين نفسه في ان واحد .

ثانيا : اسئلة الفصل الثاني صفحة (٣٦)

السؤال الاول :

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥
رمز الاجابة	د	أ	ج	أ	ب

السؤال الثاني : ١- الشيفرة الوراثية : تمثل الشيفرة الوراثية تسلسل النيوكليوتيدات في DNA والتي يتم نسخها على mRNA ومن خلالها يتم بناء البروتين او ظهور صفات وراثية لدى الكائن الحي .

٢- الكودون : الشيفرة ثلاثية النيوكليوتيدات والتي توجد على جزيء mRNA ويتم ترجمتها بواسطة الرايبوسوم الى حموض امينية

٣- الكودون المضاد: الشيفرة ثلاثية النيوكليوتيدات والتي توجد على جزيء tRNA ، وعندما تكون متممة للكودون يتم ربط الحمض الاميني بسلسلة عديد الببتيد .

٤- الانترون : هو تسلسل معين من النيوكليوتيدات على جزيء mRNA الاولي ولا تستخدم في بناء البروتينات ولذلك يتم التخلص منها خلال عملية المعالجة.

٥- الاكسون: هو تسلسل معين من النيوكليوتيدات على جزيء mRNA الاولي و التي تستخدم في بناء البروتينات و يتم ربطها معا بعد فصل الانترونات خلال عملية المعالجة.

٦- النسخ : هي العملية التي يتم من خلالها بناء الحموض النووية التي تلزم في بناء البروتين وهي mRNA و tRNA و rRNA

٧- الترجمة : علمية قراءة لغة النيوكليوتيدات عن mRNA وتحويلها الى لغة الحموض الامينية في سلسلة عديد الببتيد.

٩- المعالجة : هي العمليات التي يتم من خلالها تحويل mRNA الاولي الى mRNA الناضج وذلك باضافة قبعة وذيل وفصل الانترونات وربط الاكسونات .

السؤال الثالث : تحتوي الجينات الخاصة بتصنيع هذا البروتين على اكسونات و انترونات وبما انه لا تحدث عملية معالجة لسلسلة mRNA في البكتيريا فان بعض الانترونات يتم ترجمتها الى كودونات ايقاف بواسطة البكتيريا وبالتالي لا يتم انتاج نفس

السؤال الرابع: قارن بين انواع RNA من حيث التركيب و الوظيفة.

نوع RNA	التركيب	الوظيفة
١-mRNA	يتكون من سلسلة واحدة من نيوكليوتيدات A , C , G , U	نقل الشيفرة الوراثية من DNA الى الرايبوسوم لتعمل كقالب لصنع البروتين من قبل الرايبوسوم
٢-tRNA	يتكون من شريط مفرد ملتف حول نفسه ليكون ٤ حلقات، وتحتوي الحلقة الثانية على ثلاثة نيوكليوتيدات تمثل كودونا مضادا متمما لاحد الكودونات على جزيء mRNA	نقل الحموض الامينية من السيتوسول الى الرايبوسوم ليتم ربطها بروابط ببتيدية في سلسلة عديد الببتيد .
٣-rRNA	يكون شكله كروي ويوجد منه عدة انواع	يدخل في بناء الرايبوسوم ويمثل الناحية الوظيفية فيه، ويعمل على ربط الحموض الامينية المتجاورة بروابط ببتيدية اثناء عملية الترجمة .

السؤال الخامس :

ب. AUG AAA ACC CAU UGG

أ. ATG AAA ACC CAT TGG

د. تربتوفان - هستدين - ثريونين - لايسين - ميثيونين

ج. UAC UUU UGG GUA ACC

ثالثا : اسئلة الوحدة الاولى. الصفحات (٣٧-٣٨-٣٩)


السؤال الاول :

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

ج	أ	ج	أ	د	ب	ب	ب	رمز الاجابة
---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

السؤال الثاني :


المطلوب رسم فقط ، حسب السؤال.



السؤال الثالث :

١- يتم بناء جزيئات ATP في البناء الضوئي كما يأتي:

يتم ضخ أيونات الهيدروجين H^+ الناتجة من تحليل الماء إلى تجويف الثايلاكويد عبر غشاء الثايلاكويد ليصبح موجبا فتندفع H^+ عبر أنزيم بناء ATP (ATP Synthase) الموجود في غشاء الثايلاكويد مستخدما طاقة الإلكترونات التي تنتقل من ناقل إلى آخر في سلسلة نقل الإلكترون التي تربط بين النظامين الضوئيين، وبالتالي يتم استخدام هذه الطاقة في ربط جزيء




ب- اما في عملية التنفس فيتم بناء جزيئات ATP كما يلي :

① تعمل البروتينات في سلسلة نقل الإلكترون كمضخات للبروتونات H^+ ، حيث تقوم بضخ H^+ من داخل الحشوة إلى الحيز بين الغشائي $NADH + H^+ \longrightarrow NAD^+ + 2e^- + 2H^+$ باستخدام طاقة الإلكترون عبر سلسلة نقل الإلكترون كما توضح المعادلة الآتية:

② استمرار ضخ البروتونات إلى الحيز بين الغشائي يؤدي إلى زيادة تركيز أيونات الهيدروجين H^+ هناك، ويؤدي ذلك إلى انتقال أيونات الهيدروجين بفعل فرق التركيز إلى داخل الحشوة عبر أنزيم بناء ATP.

③ هذا الانتقال يؤدي إلى تنشيط أنزيم بناء ATP، وبالتالي بناء ATP من جزيئات ADP ومجموعات الفوسفات، كما توضح المعادلة الآتية:



السؤال الرابع :

عملية التنفس اللاهوائي اكثر فعالية لان كمية الطاقة الناتجة من خلالها اكبر (٣٨ ATP) منها في التخمر (٢ ATP). حيث ان عملية التنفس اللاهوائي يتم خلالها تكسير كل الروابط الكيميائية في جزيئ الجلوكوز والحصول على الطاقة المحتزنة في هذه الجزيئات، اما في عملية التخمر فانه يتم انتاج حمض اللين او الايثانول وكلاهما (حمض اللين و الايثانول) يوجد بهما روابط كيميائية لم يتم تحرير الطاقة منها .

السؤال الخامس :

من حيث شروط حدوثها	التنفس الخلوي الهوائي	التخمر
عدد ATP الناتجة	٣٨	٢
مثال على الكائنات الحية	الكائنات التي تعتمد على وجود الاكسجين مثل خلايا الانسان	خلايا العضلات بغياب الاكسجين البكتيريا و الخميرة

السؤال السادس :

وتتم عملية المعالجة بثلاث مراحل اساسية هي :

١- اضافة القبعة (Capping) :

يتم اضافة نيوكليوتيد الغوانين (G) في نهاية السلسلة هليرتبط مع النيوكليوتيد الاول في شريط mRNA برابطة ثلاثية الفوسفات بما يسمى بالقبعة (Cap). وللقبعة دور مهم في ثبات وحماية mRNA من التحلل في السيتوبلازم ولها دور في عملية الترجمة حيث تشكل اشارة لارتباط mRNA بالرايبوسوم .

٢- اضافة ذيل ادينين (Polyadenylation) :

تهدف هذه العملية الى مساعدة mRNA في خروجه من الغلاف النووي الى السيتوسول و الحفاظ على ثباته وعدم تحطمه في السيتوبلازم مما يساعد في ارتباطه بالرايبوسوم ، وتتم من خلال اضافة ذيل من وحدات متكررة (٥٠-٢٥٠) وحدة من نيوكليوتيد الادينين (tail -A-Poly) .

٣- ازالة الانترونات (Splicing) :

يتكون mRNA الاول من سلسلة تحتوي انترونات (Introns) و اكسونات (Exons) ، وتمثل الاكسونات الاجزاء الفاعلة التي يتم ترجمتها الى حموض امينية ،بينما تمثل الانترونات اجزاء غير فاعلة في بناء البروتين . حيث يتم في هذه المرحلة ازالة الانترونات وربط الاكسونات معا مكونة mRNA الناضج .

السؤال السابع :

١ . سيستين

٢ سيستين -غلوتاميك - سيستين - ارجنين - برولين -برولين

٣ . احد الثلاثيات الاتية و التي يؤدي نسخها الى كودون ايقاف في جزيئ mRNA ATT او ATC او ACT

٤ . CCC CCA CGG UGU GAA UGU

5 . UGA هو كودون ايقاف ، وبالتالي لن يتم ترجمة الكودون الذي بعده وتتوقف عملية الترجمة.

السؤال الثامن :

يتكون كل نظام ضوئي من:

أ-مركز التفاعل :نظام بروتيني يحتوي على جزيئين من كلوروفيل a ، ومستقبل الكتروني اولي ويكون جزيئا الكلوروفيل في مركز التفاعل قادرين على اطلاق الكترونات منشطة.

ب-انواع مختلفة من الصبغات ، مثل : كلورفيل a ، وكلوروفيل b، والكاروتين مرتبطة بروتينات تعمل كقاطات تمتص الطاقة الضوئية، ومن ثم تمررها لمركز التفاعل.

السؤال التاسع:

أ-يُحصل كل جزيء من حمض غليسرين احادي الفوسفات من الجزيئات الستة التي تكونت على مجموعة فوسفات من جزيء ATP، فيتكون حمض غليسرين ثنائي الفوسفات)، ويعمل مركب NADPH على اختزال حمض غليسرين ثنائي الفوسفات الى غليسر الدهايد احادي الفوسفات، حيث يتكون ستة جزيئات من (G3P) .

ب- يتم انتاج 5 G3P كنتاج نهائي.

السؤال العاشر : أ- ينتج 4 G3P كنتاج نهائي. ب- يتم استهلاك 24 NADPH

السؤال الحادي عشر: أ. السيتوسول ب. ATP / NADH / بيروفيت / H₂O .

السؤال الثاني عشر: أ. حشوة المايوتوكندريا. ب. (1 NADH) (لا يتم انتاج ATP) (1CO₂)

السؤال الثالث عشر:

أ- انقاص الوزن :تعمل هذه المادة على تسريع عملية تحليل المركبات العضوية في الجسم ، مما يؤدي الى تنشيط الانزيمات التي تؤدي الى تحليل الكربوهيدرات و الدهون والبروتينات في الغذاء .

ب-موت المرضى :

تعمل مادة DNP على منع انزيم بناء ATP من ضخ البروتونات الى الحشوة فتتوقف عملية بناء ATP فتتوقف عملية التنفس ويموت الانسان .

السؤال الرابع عشر: أ. CGA UUG UAG ب. GCU AAC AUC

السؤال الخامس عشر : المراحل التفصيلية لبناء سلسلة عديد الببتيد (البروتين) :

اولا : نسخ mRNA .

تتكون عملية نسخ mRNA من ثلاثة مراحل هي : البدء و الاستطالة و الانتهاء .

١-البدء :تعمل عوامل خاصة تسمى عوامل النسخ على مساعدة انزيم بلمرة RNA للتعرف على بداية الجين المراد نسخه من السلسلة (٣-٥) من خلال تتابع معين من النيوكليوتيدات تسمى المحفز (Promoter) فيرتبط الانزيم ويتم فتح سلسلتي DNA

الملتقتين في هذا الموقع ثم يبدأ انزيم بلمرة RNA عملية النسخ.

٢-الاستطالة : يعمل انزيم بلمرة RNA على اضافة نيوكليوتيدات للسلسلة الثانية من mRNA بحيث تكون متممة لتلك الموجودة على قالب DNA وبمجرد مرور الانزيم تعود سلسلتا DNA للالتفاف مرة اخرى وبالتالي ارتباط النيوكليوتيدات في السلسلتين من جديد.

٣-الانهاء : يصل انزيم بلمرة RNA الى تتابع معين من النيوكليوتيدات يسمى منطقة الانهاء (Termination Point) حيث ينفصل الانزيم عن سلسلة DNA وتتفصل سلسلة mRNA الجديدة التي تم تصنيعها من قالب DNA وبعد الانتهاء من عملية النسخ تنفك العوامل الخاصة بالنسخ .

وتسمى السلسلة الناتجة mRNA الاولى (Primary mRNA)، حيث تمر هذه السلسلة بمرحلة معالجة لينتج من خلالها mRNA الناضج ، الشكل (٤)، وتتم عملية المعالجة بثلاث مراحل اساسية هي :

١-اضافة القبعة (Capping) :

يتم اضافة نيوكليوتيد الغوانين (G) في نهاية السلسلة ليرتبط مع النيوكليوتيد الاول في شريط mRNA برابطة ثلاثية الفوسفات بما يسمى بالقبعة (Cap). وللقبعة دور مهم في ثبات وحماية mRNA من التحلل في السيتوبلازم ولها دور في عملية الترجمة حيث تشكل اشارة لارتباط mRNA بالريبوسوم .

٢-اضافة ذيل ادينين:

تهدف هذه العملية الى مساعدة mRNA في خروجه من الغلاف النووي الى السيتوسول و الحفاظ على ثباته وعدم تحطمه في السيتوبلازم مما يساعد في ارتباطه بالريبوسوم ، وتتم من خلال اضافة ذيل من وحدات متكررة (٥٠-٢٥٠) وحدة من نيوكليوتيد الاديينين.

٣-ازالة الانترونات:

يتكون mRNA الاولى من سلسلة تحتوي انترونات واكسونات، وتمثل الاكسونات الاجزاء الفاعلة التي يتم ترجمتها الى حموض امينية ،بينما تمثل الانترونات اجزاء غير فاعلة في بناء البروتين . حيث يتم في هذه المرحلة ازالة الانترونات وربط الاكسونات معا مكونة mRNA الناضج .

ثانيا : الترجمة : تمر عملية الترجمة بثلاث مراحل هي : البدء ، الاستطالة، الانتهاء.

١-مرحلة البدء :

أ-يرتبط mRNA بالوحدة البنائية الصغيرة على الريبوسوم ، بحيث يكون كودون البدء (AUG) في موقع P ، ويتم توجيه ذلك بواسطة اشارة خاصة من نيوكليوتيدات موجودة في مقدمة mRNA (القبعة)، ثم يرتبط tRNA الحامل للمثيونين على كودون البدء.

ب-ترتبط الوحدة البنائية الكبيرة بالوحدة البنائية الصغيرة . ومع نهاية العملية يكون tRNA في موقع P و الموقع A يكون فارغا

ومستعدا لاستقبال جزيء tRNA التالي .

٢-مرحلة الاستطالة :

أ-يرتبط الكودون المضاد في الجزيء القادم من tRNA و الحامل للحمض الاميني بروابط هيدروجينية مع الكودون المتمم على mRNA في موقع A .

ب- يعمل rRNA في الوحدة البنائية الكبيرة كإنزيم (Ribozyme) على تكوين روابط ببتيدية بين الحمض الاميني في موقع P و الحمض الاميني في موقع A وعندها ينفصل tRNA في موقع P عن الحمض الاميني الحامل له .

ج- يتحرك الرايبوسوم بمقدار كودون واحد فينتقل tRNA من موقع A الى موقع P ونتيجة لذلك يتغير موقع tRNA الحامل لثنائي الببتيد من موقع A الى موقع P ويصبح موقع A فارغا ومستعدا لاستقبال جزيء جديد من tRNA .

٣-مرحلة الانهاء:

تستمر عملية الترجمة حتى يصل احد كودونات الايقاف (UUU او UAG او UGA) في mRNA الى موقع A في الرايبوسوم .فيرتبط عامل بروتيني خاص (Relaese Factor) مع كودون الايقاف في موقع A بدلا من tRNA . وبذلك تتفصل سلسلة عديد الببتيد عن tRNA في موقع P ، ثم تتفصل الودحتان البنائيتان للرايبوسوم و العامل البروتيني .

السؤال السادس عشر:

أ- تصنيع هرمون الانسولين: يتم معالجة عديد الببتيد من خلال تقسيم سلسلة عديد الببتيد الى قطعتين او اكثر بواسطة الانزيمات.

ب- تصنيع بروتين الهيموغلوبين : يتم معالجة عديد الببتيد من خلال ارتباط سلسلتين او اكثر من عديد الببتيد نفسه لتشكل وحدة من البروتين الفاعل، بعد ان كانتا سلسلتين منفصلتين تم تصنيعهما بشكل مستقل .

السؤال السابع عشر : أ. (السلسلة أ: DNA) (السلسلة ب tRNA) (السلسلة ج mRNA)

ب. (١ TTT) (٢ UUU) (٣ AAA) (٤ GGC)

ج. AAA AAA GGC

د. السلسلة ب وهي CCG UUU UUU

اجابات اسئلة الوحدة الثانية : الوراثة

2

الوحدة الثانية

Genetics الوراثة



الجينات الوراثية سر الحياة والتنوع

«أنا مقتنع بأنه لن يمر وقت طويل قبل أن يعترف العالم
بأسره بنتائج أبحاثي»
غريغور مندل



الوحدة الثانية - الفصل الاول : قانونا مندل في الوراثة

اولا : الاسئلة خلال المحتوى


١-سؤال صفحة (٤٣) :

الحل: نرمز للأزهار المحورية بالرمز A، وللأزهار الطرفية بالرمز a

أزهار طرفية	أزهار محورية	P الطراز الشكلي للأباء
aa	AA	الطراز الجيني للأباء
a	A	الجاميتات
100%	Aa	F ₁
محوري الأزهار		

F ₁ x F ₁	Aa	x	Aa
الجاميتات	A , a	x	A , a
F ₂	AA	Aa	Aa
	3	:	1
	محوري الأزهار		طرفي الأزهار

٢-سؤال صفحة (٤٥) : (فرع ١ + ٢ + ٣) الاجابة من خلال المخطط الاتي:



ينتج (٤) أنواع من الغاميتات لكل أب و يمكن إيجادها باستخدام القانون التالي 2ⁿ حيث n يمثل عدد الصفات غيرالنقية.

٥. أكتب الطرز الشكلية لأفراد الجيل الثاني.

		غاميتات			
		(RY)	(Ry)	(rY)	(ry)
F ₂	(RY)	صفراء ملساء RRYY	صفراء ملساء RRYy	صفراء ملساء RrYY	صفراء ملساء RrYy
	(Ry)	صفراء ملساء RRYy	خضراء ملساء RRyy	صفراء ملساء RrYy	خضراء ملساء Rryy
	(rY)	صفراء ملساء RrYY	صفراء ملساء RrYy	صفراء مجعدة rrYY	صفراء مجعدة rrYy
	(ry)	صفراء ملساء RrYy	خضراء ملساء Rryy	صفراء مجعدة rrYy	خضراء مجعدة rryy

٦. كم نوعا من الطرز الشكلية ظهر بين أفراد الجيل الثاني.

ظهرت (٤) طرز شكلية بين أفراد الجيل الثاني

٧. ما نسبة الأفراد خضراء البذور إلى صفراء البذور في الجيل الثاني؟

النسبة ٣ صفراء : ١ خضراء

٨. ما نسبة الأفراد ملساء البذور إلى مجعدة البذور في الجيل الثاني؟

النسبة ٣ ملساء : ١ مجعد

٣-سؤال صفحة (٤٧) : (إجابة الأفرع ١ ، ٢ ، ٣) : من خلال مربع بانيت الآتي.

		أرجواني الأزهار أخضر القرون	أرجواني الأزهار أخضر القرون		
	P	PpGg	x	PpGg	
		PG	Pg	pG	
		pg			
PG		PPGG أرجوانية خضراء	PPGg أرجوانية خضراء	PpGG أرجوانية خضراء	PpGg أرجوانية خضراء
Pg		PPGg أرجوانية خضراء	PPgg أرجوانية صفراء	PpGg أرجوانية خضراء	Ppgg أرجوانية صفراء
pG		PpGG أرجوانية خضراء	PpGg أرجوانية خضراء	ppGG بيضاء خضراء	ppGg بيضاء خضراء
pg		PpGg أرجوانية خضراء	Ppgg أرجوانية صفراء	ppGg بيضاء خضراء	ppgg بيضاء صفراء

٤-نسبة احتمال ظهور الطراز الجيني Ppgg هي

و نسبة احتمال ظهور الطراز الشكلي أرجوانية خضراء هي $\frac{9}{16}$

٤-سؤال صفحة (٤٨) : (إجابة الأفرع ١ ، ٢ ، ٣) : من خلال مربع بانيت الآتي.


		أحمر الثمار أصفر الأزهار طويل	أصفر الثمار أبيض الأزهار قصير	
	P	RRwwTT	x	rrWWtt
	G	RwT	x	rWt
	F ₁	RrWwTt		
		أحمر الثمار	%100	أبيض الأزهار طويل

٥-سؤال: صفحة (49) :


يتم ذلك عن طريق إجراء التلقيح الاختباري للفرد السائد مجهول النقاوة مع فرد متنحي :

- إذا كان الفرد السائد نقيا سيظهر جميع أفراد النسل باللون الأسود
- إذا كان الفرد السائد غير متمائل الجينات سيظهر نصف أفراد النسل بلون أسود و النصف الآخر باللون البني.

التوضيح الرياضي كما يلي:



50% أسود اللون Bb 50% بني اللون bb



100% أسود Bb غير متمائل الجينات

الوحدة الثانية - الفصل الاول : قانونا مندل في الوراثة

ثانيا : اسئلة الفصل الاول -صفحة (٥٠)

السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
رمز الاجابة	د	ج	د	ج	ج	د	أ	ج

السؤال الثاني: أكتب الغاميتات لكل من الطرز الجينية الآتية:

AaRRMm AaBBcc AaBbRr aaBbrr AaBb

الحل

الغاميتات	الطرز الجيني
ARM ARm aRM aRm	AaRRMm

ABc aBc	AaBBcc
ABR ABr AbR Abr aBR aBr abR abr	AaBbRr
aBr abr	aaBbrr
AB Ab aB ab	AaBb

السؤال الثالث: أعرف كلاً مما يأتي: الحل:

قانون التوزيع المستقل (قانون مندل الثاني): إذا تزوج فردان نقيان مختلفان في أكثر من زوج من الصفات المتضادة فإن كل زوج من الجينات الخاصة بهذه الصفات تورث مستقلة عن الأخرى.

التلقيح التجريبي: تلقيح يُجرى للتمييز بين الأفراد السائدة النقية (متماثلة الجينات) والأفراد السائدة غير النقية (غيرمتماثلة الجينات) حيث يتم إجراء تلقيح تجريبي بين الفرد السائد مجهول النقاوة وفرد يحمل الصفة المتنحية، و بناء على نتائج هذا التلقيح يتم معرفة الطراز الجيني للفرد السائد.

السؤال الرابع: ما احتمال تكوّن كل من الطرز الجينية المحددة والناجمة من التزاوجات الآتية: الحل:

التزاوج	الطراز الجيني	احتمال تكونه
$AABBCC \times aabbcc$	$AaBbCc$	100%
$AABbCc \times AaBbCc$	$AAbbCC$	$\frac{1}{32}$
$AaBbCc \times AaBbCc$	$AaBbCc$	$\frac{8}{64}$ او $\frac{1}{8}$
$aaBBCC \times AABbcc$	$AaBbCc$	$\frac{1}{2}$

السؤال الخامس: أعلل ما يأتي: التلقيح التجريبي (الاختباري) مهم من الناحية الاقتصادية. التلقيح التجريبي مهم لمربي الحيوانات و المزارعين للحفاظ على نقاوة الصفة المرغوبة .


الوحدة الثانية – الفصل الثاني : الصفات غير المندلية

اولا : الاسئلة خلال المحتوى

١-سؤال صفحة (٥٣) : الحل (الجيل الاول ثم الجيل الثاني حسب المخططات الاتية)



F_1 LR 100% بيضاوي الجزور



٢-سؤال صفحة (٥٤):

الطرز الشكلية للآباء	ديك رزي اللون	دجاجة بيضاء اللون
الطرز الجينية للآباء	$C^B C^W$	$C^W C^W$
الجاميتات	C^B , C^W	C^W
الطرز الجينية للابناء	$C^W C^W$	$C^B C^W$
الطرز الشكلية للابناء	٥٠% ابيض اللون	٥٠% رزي اللون

٣-سؤال صفحة (٥) :

١- ما سبب الاختلاف بين فصائل الدم المختلفة ؟

يعتبر نظام الدم ABO من الأمثلة على الأليالات المتعددة وفي هذا النظام توجد ثلاثة أليالات هي I^A و I^B و i تشغل نفس الموقع على الكروموسوم رقم ٩ ومسؤولة عن ظهور أربعة طرز شكلية مختلفة بالاعتماد على وجود أي من الانتيجينين A أو B أو وجودهما معا أو عدم وجودهما على أغشية خلايا الدم الحمراء

2) ما أنواع السيادة الموجودة، أفسر إجابتني؟

الأليل^A I يسود سيادة تامة على الأليل i

الأليل I^B يسود سيادة تامة على الأليل i

نوع السيادة بين الأليل I^A و الأليل I^B سيادة مشتركة

الحل:

3 أكتب الطرز الجينية والشكلية المحتملة للأبناء، إذا كان كلا الأبوين فصيلة دمهما AB.

الطرز الشكلية للآباء رجل فصيلة دمه AB امرأة فصيلة دمها AB

P $I^A I^B$ x $I^A I^B$ الطر الجينية للآباء

G I^A , I^B I^A , I^B الجامعيات

الطرز الجينية للبناء $|^A|^A$, $|^A|^B$, $|^A|^B$, $|^B|^B$

A AB B الطرز الشكلية للأبناء

٤-سؤال صفحة (٥٦) :

١- إن أهمية التوافق بين الشخص المعطي و المستقبل هو لمنع حدوث تفاعل الأجسام المضادة في بلازما دم المستقبل مع الأنتيجينات على سطح خلايا الدم الحمراء للمعطي(تفاعل التخثر).

يأخذ دم من:	يعطي دم لـ:
١. شخص فصيلة دمه B و تفسير ذلك أن نوع الاجسام المضادة في دم المستقبل B هو A فلا يمكن ان يحدث تفاعل تخثر مع الانتيجين B لدم المعطي. ٢. يأخذ ايضا من شخص فصيلة دمه O و تفسير ذلك أنه لا توجد انتيجينات على أغشية خلايا الدم الحمراء فيها فلا يحدث تفاعل تخثر بينها و بين المستقبل B.	١. شخص فصيلة دمه B . ٢. يعطي أيضا لفصيلة AB و تفسير ذلك أن بلازما دم المستقبل AB تخلو من الاجسام المضادة فلا يحصل تفاعل تخثر بينها و بين المعطي B .

٢. أية فصيلة دم تعطي جميع الفصائل الأخرى؟ فصيلة الدم O تعطي جميع الفصائل.

٣. أية فصيلة دم تأخذ من جميع الفصائل ؟ فصيلة الدم AB تأخذ من جميع الفصائل.

٥-سؤال صفحة (٥٩) :الحل .

$$\begin{array}{c}
 \text{قط مانكس} \quad \text{قط مانكس} \\
 P \quad Tt \times Tt \\
 G \quad (T)(t) \times (T)(t) \\
 F_1 \quad TT \quad Tt \quad tt \\
 \text{مانكس} \quad \text{مانكس} \quad \text{قط عادي} \\
 \text{يموت} \quad 2 \quad : \quad 1
 \end{array}$$

الطراز الشكلي المانكس سائد على الطراز الشكلي الطبيعي لكنه متنحي بالنسبة لصفة القتل.

٦-اجابة اسئلة النشاط رقم(٢) صفحة (٦٠) :

١. ما الأساس المعتمد في تصنيف الفئات لصفة لون الجلد؟

الأساس هو عدد الجينات السائدة الذي يحدد درجة لون الجلد و كما يظهر من شكل (٧): عدد الجينات السائدة يساوي صفر عند اصحاب البشرة الفاتحة جدا و يتدرج الى أن يصبح عدد الجينات السائدة ٦ جينات لدى اصحاب البشرة الغامقة جدا.

٢. أكتب الطرز الجينية للون الجلد الفاتح جدا و الغامق جدا.

الطرز الجيني للون الجلد الفاتح جدا هو: aabbcc.

الطرز الجيني للون الجلد الغامق جدا هو: AABbCC

٣. اكتب طرازين جينيين يعطيان التأثير نفسه للطرز الجيني AABbCC

AaBBCC و AABbCc

٤. ما عدد الجينات السائدة في الفئة الأكثر انتشارا للون الجلد؟

كما هو واضح من الشكل (٧) عدد الجينات السائدة في الفئة الأكثر انتشارا للون الجلد هو ٣ جينات.

٥. اكتب الطرز الجينية لصفة اللون الفاتح.

Aabbcc و aaBbcc و aabbCc

٧- اسئلة الشكل (٨) صفحة (٦١) :

١- الذكر : ZZ . الانثى : ZW .

٢- الحل

ذكر	X	انثى
ZZ	X	ZW
Z	X	Z , W
ZW	,	ZZ
انثى		ذكر

٣- مقارنة بين تحديد الجنس في الانسان و الطيور:

الانسان	الطيور	
الذكر: XY	الذكر: ZZ	الطرز الجيني الجنسي
الانثى: XX	الانثى: ZW	
الذكر	الانثى	الذي يحدد الجنس

8-سؤال على الشكل (٩) صفحة (٦٢) :

نسبة وجود ذكر مصاب من النسل هي ٢٥% او ٥٠% من بين الذكور

٩-سؤال صفحة (٦٣) :

نظرا لوجود احتمالان للذكر (b^+b او b^+b^+) لذلك يوجد احتمالان للتزاوج:


الاحتمال الأول				الاحتمال الثاني			
أنثى بقرون		ذكر بقرون		أنثى بقرون		ذكر بقرون	
P b^+b^+		X		P b^+b		X	
G b^+		X		G b^+		X	
F ₁ b^+b^+		F ₁ b^+b^+		F ₁ b^+b^+		F ₁ b^+b^+	
ذكر/ أنثى بقرون		ذكر/ أنثى بقرون		ذكر/ أنثى بقرون		ذكر/ أنثى بقرون	

١٠-سؤال صفحة (٦٥) : هل الارتباط التام للجينات شائع أم نادر في الطبيعة؟

الارتباط التام للجينات نادر في الطبيعة بدليل حدوث عملية العبور و تكوين تراكيب جينية جديدة بين الجينات التي تقع على نفس الكروموسوم.

١١-سؤال صفحة (٦٦) :

- المسافة بين A و B = ١٢ سنتيمورغان
- المسافة بين A و C = ١٧ سنتيمورغان
- نسبة ارتباط C و D ٧٥% منها المسافة بينهما ٢٥ سنتيمورغان
- نسبة ارتباط B و D ٨٠% منها المسافة بينهما ٢٠ سنتيمورغان



المسافة بين A و D = ٨ سنتيمورغان

نسبة العبور بين C و B = ٥%

١٢-سؤال صفحة (٦٥) :هل الارتباط التام للجينات شائع أم نادر في الطبيعة؟

١. اقارن بين عدد الكروموسومات في الطراز الكروموسومي لمتلازمة داون مع الطراز الكروموسومي الطبيعي و افسر الاختلاف بينهما.

عدد كروموسومات الطراز الطبيعي = ٤٦ كروموسوم.

عدد كروموسومات في الطراز الكروموسومي لمتلازمة داون هو ٤٧ كروموسوم لوجود ٣ نسخ من الكروموسوم رقم ٢١ بدلا من نسختين في الحالة الطبيعية.

٢. أي من الطرز الكروموسومية يحتوي على ٣ كروموسومات جنسية؟

متلازمة كلينفلتر حيث توجد كروموسومات جنسية XXY.

٣.بالاعتماد على الطرز الكروموسومية كيف يمكن تشخيص مريض مصاب بمتلازمة إدواردز ، متلازمة تيرنر، متلازمة كلينفلتر؟

يظهر من الشكل (١٧) أن عدد كروموسومات مريض مصاب بمتلازمة إدواردز هو ٤٧ كروموسوم حيث يوجد ثلاث نسخ من الكروموسوم رقم ١٨ بدلا من نسختين. (يمكن أن يكون أنثى أو ذكر)
و في حالة مريض مصاب بمتلازمة كلينفلتر عدد الكروموسومات هو ٤٧ كروموسوم حيث يوجد ثلاث كروموسومات جنسية XXY و جنس المريض ذكر.

اما تيرنر فعدد الكروموسومات ٤٥ كروموسوم فهي أنثى فقدت أحد كروموسومي X .

الوحدة الثانية - الفصل الثاني : الصفات غير المنندلية

ثانيا : اسئلة الفصل الثاني -صفحة (٧١)

السؤال الأول :أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي:

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥
رمز الاجابة	ب	ج	ج	ج	أ

السؤال الثاني: أعرف كلاً مما يأتي:

الحل:

الجينات القاتلة: هي جينات طفرة سائدة او متنحية، عند وجودها في الكائن الحي تؤدي الى وفاته .
الارتباط : وجود زوج أو أكثر من الجينات التي تقع على نفس الكروموسوم قريبة من بعضها البعض لذا فهي تورث معا كوحدة واحدة مرتبطة مع بعضها البعض.
العبور: تبادل المادة الوراثية بين الكروماتيدات غير الشقيقة لكروموسومين متناظرين عند تكوين الرباعيات في الطور التمهيدي الأول من الانقسام المنصف مما ينتج عنه تراكيب وراثية جديدة.

السؤال الثالث: ما الفرق بين الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس؟

الحل:

الصفات المرتبطة بالجنس : هي تلك التي تحمل جيناتها على الكروموسومات الجنسية X أو Y مثل مرض نزف الدم في الانسان . (صفة تحمل جيناتها على الكروموسوم الجنسي X).
 والصفات المتأثرة بالجنس : هي تلك التي تقع جيناتها على الكروموسومات الجسمية وتعبر عن نفسها بصورة مختلفة في الذكور عن الإناث بسبب تأثير الهرمونات الجنسية (مثل صفة الصلع في الإنسان التي تتأثر بهرمون التستوستيرون عند الذكور).

السؤال الرابع: أقرن بين كل من السيادة غير التامة والسيادة المشتركة.

نوع السيادة	السيادة التامة	السيادة المشتركة
اللية التوارث	الحالة التي لا يسود أي من الجينين الأليلين على الآخر و إنما يكون الفرد الهجين (غير متماثل الجينات) مختلفا عن الأبوين و يُظهر صفة وسطا بينهما تكون مزيج بين الصفتين .	و هي الحالة التي يُظهر فيها كلا الجينين الأليلين تأثيره كاملا في الفرد الهجين (غير متماثل الجينات
مثال	لون أزهار نبات الساعة الرابعة	فصيلة الدم AB و اللون الرزي في الدجاج

السؤال الخامس: أعلل العبارات الآتية:

الحل:

أ - شاب و أخته لهما الطراز الجيني نفسه، لكنهما مختلفان في الطراز الشكلي.
 لأن الصفة متأثرة بالجنس وتعبر عن نفسها بصورة مختلفة في الذكور عن الإناث بسبب تأثير الهرمونات الجنسية (مثل صفة الصلع في الإنسان التي تتأثر بهرمون التستوستيرون عند الذكور).

ب - عسر النمو العضلي التدريجي من الامراض المرتبطة بالجنس، حيث ان الذكر يحتاج الى جين متنحٍ واحد للإصابة بالمرض (X^rY) اما الانثى فانها تحتاج الى زوج من الجينات المتنحية للإصابة بالمرض (X^rX^r) .

ج - صفة لون الجلد في الإنسان صفة كمية.

لأنها صفة متدرجة يصعب تصنيفها الى فئات حسب الطرز الشكلية حيث يتحكم بها ثلاثة أزواج من الجينات على الاقل (جينات متعددة تقع على كروموسومات مختلفة) تشترك هذه الجينات معا و يكون تأثيرها تراكميا فتظهر الصفة متدرجة.

د - ظهور زهور بيضاء من بين أفراد الجيل الثاني لنبات الساعة الرابعة.

ظهور الزهور البيضاء ناتج من تلقيح بين نباتين بأزهار وردية RW فكما يظهر من التركيب الوراثي RW اللون الوردي (الزهري) صفة وسطية بين اللونين الأحمر و الابيض (سيادة غير تامة) ، ويظهر لون الأزهار الأبيض عند إلتقاء أليلي اللون الابيض WW معا.

او عند تلقيح نبات وردي مع نبات اخر ابيض، كذلك عند تلقيح نبات ابيض مع نبات اخر ابيض .

السؤال السادس :الحل:

أ - ما نسبة تكرار العبور بين الجينين B و D ؟

٢%

ب - ما نسبة الارتباط بين الجينين A و C ؟

نسبة الارتباط = ١٠٠ % - نسبة تكرار العبور

$$= ١٠٠ - ١$$

$$= ٩٩\%$$

ج - أرسم خريطة جينية تبين مواقع الجينات الأربعة على طول الكروموسوم.

من الجدول:


- المسافة بين A و B = ٦ سنتيمورغان

- المسافة بين A و C = 1 سنتيمورغان

- المسافة بين A و D = 4 سنتيمورغان

- المسافة بين B و C = 7 سنتيمورغان

- المسافة بين B و D = 2 سنتيمورغان



- المسافة بين C و D = 5 سنتيمورغان

السؤال السابع :الحل:

أولاً: بالنسبة للون الأزهار

- أزهار أرجوانية اللون : $99 + 301 = 400$

- أزهار وردية اللون : $195 + 612 = 807$

- أزهار بيضاء اللون : $98 + 295 = 393$

النسبة: ١ أزهار أرجوانية : ٢ أزهار وردية : ١ أزهار بيضاء

نوع وراثته لون الأزهار سيادة غير تامة

ثانياً: شكل القرنت

- قرون طويلة: $301 + 612 + 295 = 1208$

- قرون قصيرة: $99 + 195 + 98 = 392$

النسبة : ٣ قرون طويلة : ١ قرون قصيرة

نوع وراثته طول القرنت سيادة تامة

- نرمل لجين للون الأزهار الأرجواني بالرمز R ، نرمل لجين للون الأزهار الأبيض بالرمز W

- نرمل لجين صفة القرون الطويلة بالرمز T، نرمل لجين صفة القرون القصيرة بالرمز t

P	أبيض الأزهار وقرون طويلة X أرجواني بقرون قصيرة.
الطراز الجيني	RRtt x WWTT
F ₁	RWtT ١٠٠% وردي بقرون طويلة
F ₁ x F ₁	RWtT x RWtT

أفراد الجيل الثاني F₂

	RT	Rt	WT	Wt
RT	RRTT أرجواني، طويل	RRTt أرجواني، طويل	RWTT وردي، طويل	RWtT وردي، طويل
Rt	RRTt أرجواني، طويل	RRtt أرجواني، قصير	RWtT وردي، طويل	RWtt وردي، قصير
WT	RWTT وردي، طويل	RWtT وردي، طويل	WWTT أبيض، طويل	WWtT أبيض، طويل
Wt	RWtT وردي، طويل	RWtt وردي، قصير	WWtT أبيض، طويل	WWtt أبيض، قصير

السؤال الثامن :الإجابة:

الأب طبيعي	الأم : متعددة الأصابع (٦ أصابع)	الطراز الشكلي للأباء
dd	Dd	الطراز الجيني للأباء
d	D , d	الجاميئات
dd%٥٠ ,	Dd %٥٠ ,	النسل

السؤال التاسع: الحل: نرمز لجين الرؤية الطبيعية بالرمز R و لجين عمى الألوان بالرمز r .

رجل طبيعي الرؤية فصيلة دمه B X فصيلة دمها A	P (الطراز الشكلي)
$X^R X^r I^A i$ X $X^R Y I^B i$	الطراز الجيني

الأبناء

♂	$X^R I^B$	$X^R i$	$Y I^B$	$Y i$
♀	$X^R I^A$ أنثى طبيعية ، فصيلة دم AB	$X^R X^R I^A i$ أنثى طبيعية ، فصيلة دم A	$X^R Y I^A I^B$ ذكر طبيعي ، فصيلة دم AB	$X^R Y I^A i$ ذكر طبيعي، فصيلة دم A
$X^R i$	$X^R X^R I^B i$ أنثى طبيعية ، فصيلة دم B	$X^R X^R i i$ أنثى طبيعية ، فصيلة دم O	$X^R Y I^B i$ ذكر طبيعي، فصيلة دم B	$X^R Y i i$ ذكر طبيعي، فصيلة دم O
$X^r I^A$	$X^R X^r I^A I^B$ أنثى طبيعية ، فصيلة دم AB	$X^R X^r I^A i$ أنثى طبيعية ، فصيلة دم A	$X^r Y I^A I^B$ ذكر مصاب ، فصيلة دم AB	$X^r Y I^A i$ ذكر مصاب ، فصيلة دم A
$X^r i$	$X^R X^r I^B i$ أنثى طبيعية ، فصيلة دم B	$X^R X^r i i$ أنثى طبيعية ، فصيلة دم O	$X^r Y I^B i$ ذكر مصاب فصيلة دم B	$X^r Y i i$ ذكر مصاب فصيلة دم O

السؤال العاشر : الحل:

- لون الأزهار الأرجواني يسود سيادة تامة على اللون الأبيض و القرون بأشواك تسود سيادة تامة على القرون الملساء.
- نرمز لجين اللون الأرجواني بالرمز R، و جين اللون الأبيض بالرمز r
- نرمز للقرون بأشواك بالرمز S ، و للقرون الملساء بالرمز s

الآباء		
الطراز الأول	أرجواني بأشواك × أرجواني بأشواك RrSs x RrSs	الطراز الشكلي الطراز الجيني
التزاوج الثاني	أرجواني بأشواك × أرجواني أملس RRss x RRSs Rrss x RRSs RRss x RrSs	الطراز الشكلي الطراز الجيني
التزاوج الثالث	أرجواني بأشواك × أبيض بأشواك rrSs x RrSs	الطراز الشكلي الطراز الجيني
التزاوج الرابع	أرجواني أملس × أرجواني أملس Rrss x Rrss	الطراز الشكلي الطراز الجيني

السؤال الحادي عشر: أدرس نمط التوارث في الشكل المجاور، ثم أجب عن الأسئلة الآتية: الحل:

١. ما آلية توارث هذه الصفة؟ سيادة غير تامة
٢. أكتب الطرز الجينية والشكلية للجيلين الأول والثاني، ونسبة كل منهما

نرمز لجين اللون الأحمر بالرمز R، و نرمز لجين اللون الأبيض بالرمز W

**الجيل الاول
ونسبته**

أزهار بيضاء X أزهار حمراء	P (الطرز الشكلي)
RR WW x	الطرز الجيني
RW ١٠٠% أزهار وردية	F ₁

الجيل الثاني ونسبته

$F_1 \times F_1$	أزهار وردية
الطراز الجيني	$RW \times RW$
G	
F_2	

السؤال الثاني عشر : وجد مربي طيور أن ربع البيض الناتج في مزرعته لا يفقس، و أن ثلثي الناتج ذكور .أفسر هذه النتائج على أسس وراثية.

الحل:

بما أن ربع البيض لم يفقس إذن هذه حالة جينات قاتلة متتحية، و بما أنه ذكر أن ثلثي الناتج ذكور معنى ذلك أن الجين المتتحي القاتل (b) مرتبط بالجنس.
في الطيور الأنثى تحدد الجنس.

P (الطراز الشكلي)	أنثى الطائر X ذكر الطائر
الطراز الجيني	$Z^B Z^b \times Z^B W$
G	$Z^B, Z^b \times Z^B, W$
F_1	

السؤال الثالث عشر : لون الجلد في الخيول :

بالاعتماد على النتائج أعلاه، أستنتج نمط وراثة اللون، و أحدد الطرز الجينية لألوان الخيول المختلفة، و أمثل التزاوج رقم 4 وراثيا.

الوراثة: سيادة غير تامة

– اللون البالمينو BK

– اللون الكستنائي BB

– اللون الكريمي KK

التزاوج رقم - ٤

P	بالمينو x بالمينو
الطراز الجيني	□BK x BK
G الغاميتات	B K B K
F ₁	BB كستنائي $\frac{1}{4}$ BK BK بالومينو $\frac{2}{4}$ KK كريمي $\frac{1}{4}$

السؤال الرابع عشر: الحل . نرمز للجين الطبيعي بالرمز T، و نرمز لجين أنيميا الفول بالرمز t.

P (الطراز الشكلي)	رجل طبيعي X امرأة طبيعية
الطراز الجيني	$X^T X^t \times X^T Y$
G	X^T, X^t, X^T, Y
F ₁	$X^T X^T, X^T Y, X^T X^t, X^t Y$

نلاحظ من الجدول أعلاه أن ٧٥% من افراد النسل طبيعيين و ٢٥% مصاب بأنيميا الفول.

(٥٠% من الذكور مصابين بأنيميا الفول، و الاناث سليمة جميعها)

٢. إذا كان الزوج مصاباً بالفول، هل تختلف النسبة عن الإجابة الأولى؟

P (الطراز الشكلي)	رجل مصاب X امرأة طبيعية
الطراز الجيني	$X^T X^t \times X^t Y$
G	X^T, X^t, X^t, Y
F ₁	$X^T X^t, X^T Y, X^t X^t, X^t Y$

من التزاوج أعلاه نلاحظ أنه عندما يكون الزوج مصاب فإن نصف أفراد النسل سيكونون مصابين بالمرض.

السؤال الخامس عشر: تم إجراء التلقيح الاختباري التالي:



وظهر أفراد النسل بالنسب التالية:

أفراد تحمل صفات الأبوين : 450 AaBb-450 aabb

أفراد بتراكيب جينية جديدة : 50 Aabb- 50 aaBb

١. جد نسبة تكرار التراكيب الجينية الجديدة للجينين (a-b)

الحل:

نحسب نسبة تكرار التراكيب الجينية الجديدة باستخدام القانون الآتي:

$$\text{نسبة تكرار التراكيب الجينية الجديدة} = \frac{\text{عدد أفراد التراكيب الجينية الجديدة}}{\text{عدد الأفراد الكلي}} \times (100\%)$$

$$100\% \times \frac{50 + 50}{1000} =$$

$$\frac{100}{1000} =$$

$$100\% \times 0.1 =$$

$$10\% =$$

٢. أجد المسافة بين a و b

المسافة بين a و b هي ١٠ سنتيمورغان (وحدة خريطة)

السؤال السادس عشر: اتخيل أن أحد والدي يعاني من مرض هنتغتون ، ما احتمال أن يظهر لدي في يوم من الأيام؟ هل أوفق على إجراء فحص يكشف عن أليل المرض أم لا؟ أفسر اجابتي.

يترك الجواب للطالب

الوحدة الثانية - الفصل الثالث : تطبيقات في علم الوراثة

أولاً : الأسئلة خلال المحتوى

١-سؤال صفحة (٧٧) : لماذا يتم قطع سلسلتي DNA وليس سلسله واحدة من قبل أنزيمات القطع؟

لأن سلسلتي جزيئة الـ DNA متممتان لبعضهما البعض ، و إنزيم القطع يقرأ تتابعا معينا يقطع عنده كلا السلسلتين مكونا نهايات لزجة تسمح بارتباط جزيئة الـ DNA مع جزيئة أخرى قطعت بنفس إنزيم القطع.

٢-الأسئلة على الشكل (٢) صفحة (٧٧) .

١.كيف أفسر اختيار البلازميد لحمل جين الانسولين؟

لسهولة الحصول على البلازميدات و سهولة التعامل معها و حجمها المناسب ، و تضاعفها المستقل عن الكروموسوم البكتيري، بالإضافة لاحتوائها على مواقع مختلفة لانزيمات القطع.

٢. أتتبع الخطوات الرئيسة لإنتاج هرمون الإنسولين :

أ.يقص كل من الـ DNA البشري (جين هرمون الإنسولين) وبلازميد البكتريا بنفس إنزيم القطع.

ب.يتم ربط الجين البشري مع البلازميد البكتيري.

ج.يتم إدخال البلازميد الى داخل الخلية البكتيرية.

د.تتكاثر البكتريا المعدلة وراثيا في وسط غذائي مناسب و تنتج هرمون الإنسولين البشري.

هـ. يتم استخلاص الإنسولين و تنقيته ليصبح في متناول مرضى السكري.

٣. أستنتج تعريف تقانة DNA معاد التركيب.

إحداث تغييرات وراثية مسيطر عليها ذات أهمية طبية أو اقتصادية عن طريق تعديل المادة الوراثية لكائن ما و ذلك بإدخال جين أو جينات لم تكن موجودة أبدا على كروموسومات ذلك الكائن لينتج مواد جديدة لم يسبق أن أنتجها مثال على سلالات بكتيرية تعمل على انتاج مواد كهرمون الأنسولين، و محاصيل زراعية معدلة وراثيا لتقاوم ملوحة التربة والآفات.

٣-سؤال صفحة (٧٩) :

الحل : الجاني هو المشتبه به الثاني لامتلاكه نفس البصمة الوراثية (نفس تتابع الأنماط القصيرة) الموجودة في عينة الدم المأخوذة من مسرح الجريمة حيث تكررت هذه التتابعات ١٢ مرة و ١٦ مرة في نفس الموقع في كلا العينتين.

٤- سؤال صفحة (٨١) :أوضح حق المستهلك بوجود عبارة"Genetically Modified Organism) GMO (" على المنتجات المعدلة وراثياً :

(ملاحظة : الإجابة للاطلاع فقط ،حيث ان هذا السؤال من الاسئلة المفتوحة التي تحتمل اكثر من اجابة)

منذ ظهور الأغذية المعدلة وراثيا في الأسواق للاستهلاك العام ثار الجدل حولها هل هي آمنة أم غير آمنة صحية أم غير صحية؟ ما التأثيرات الصحية المباشرة الناجمة عن استهلاكها؟ هل يمكن أن يحفز استهلاك الأغذية المعدلة وراثيا رد فعل تحسسي لدى بعض الناس؟، هل يمكن أن تنتقل الجينات من الأغذية المعدلة وراثيا الى أجسامنا أو الى البكتريا التي تعيش في قناتنا الهضمية؟

على الرغم من إجراء عدد من الدراسات حول الأغذية المعدلة وراثيا إلا أنه لم يوثق حتى الآن أية مخاطر على صحة الإنسان ناجمة عن استهلاكها. لكن عموما لايمكن في الوقت الحالي قياس التأثيرات بعيدة المدى (إن وجدت) للأغذية المعدلة وراثيا على صحة الإنسان.

لأجل ذلك وضعت العديد من الدول قوانين تلزم المُنتج تعريف المستهلك بوجود المواد المعدلة وراثيا من خلال الكتابة (وضع ملصق Genetically Modified)على المنتجات المعدلة وراثياً ليكون له حرية الاختيار بين منتج معدل وراثيا وآخر غير معدل.

الوحدة الثانية - الفصل الثالث : تطبيقات في علم الوراثة

ثانيا : اسئلة الفصل الثالث -صفحة (٨٢)

السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥
رمز الإجابة	ب	أ	ب	د	ج

السؤال الثاني: أعرف كلاً مما يأتي:

أنزيمات القطع: عبارة عن إنزيمات متخصصة في قطع جزيئة الDNA في مواقع محددة عن طريق التعرف على تتابع معين من النيوكليوتيدات لتقوم بالقطع في المكان المحدد.

الكائنات المعدلة وراثياً : كائنات تم تعديل المادة الوراثية لها لأغراض طبية أو اقتصادية و ذلك بإدخال جين أو جينات لم تكن موجودة أبدا الى جينومها لتنتج مواد جديدة لم يسبق أن أنتجتها .

الهجرة الكهربائية: تقنية تستخدم لفصل قطع DNA خلال مرورها في مجال كهربائي بالاعتماد على حجوماها؛ وذلك بهدف دراستها والتعرف عليها.

بصمة DNA: تتابعات من النيوكليوتيدات مميزة للفرد الواحد و تختلف من شخص لآخر (عدا التوائم المتماثلة)، ويطلق على

بعض هذه العلامات المميّزة تتابع الأنماط القصيرة.

السؤال الثالث: أعلل كلاً مما يأتي:

١. تتحرك قطع DNA باتجاه القطب الموجب أثناء الهجرة الكهربائية.
 - لامتلاك قطع الـ DNA شحنة سالبة بسبب مجموعة الفوسفات الداخلة في تركيبها.
 ٢. تعتبر إنزيمات القطع من أهم أدوات إنتاج DNA معدل وراثياً.
 - لأن لها القدرة على قطع (قص) جزيئات الـ DNA في مناطق محددة عن طريق التعرف على تتابعات معينة من النيوكليوتيدات و تكوين جزيئة DNA معادة التركيب مصدرها كائنات مختلفة.
 ٣. البلازميدات واحدة من أهم أدوات الهندسة الوراثية.
- وذلك لحجمها المناسب، وتنوعها، وسهولة الحصول عليها والتعامل معها، وتضاعفها المستقل عن الكروموسوم البكتيري بالإضافة ضافة لاحتوائها على مواقع مختلفة لأنزيمات القطع.

رابعاً : أسئلة الوحدة الثانية صفحة (٨٣)

السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
رمز الإجابة	أ	أ	أ	ب	ج	د	ج	ب

السؤال الثاني :

تحدث هذه الحالة بسبب عدم انفصال أحد أزواج الكروموسومات المتناظرة عن بعض أثناء الطور الانقسالي الأول من الانقسام المنصف، أو عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة عن بعضها في الطور الانقسالي الثاني من الانقسام المنصف.

السؤال الثالث: لدينا النسب الوراثية الآتية:

أ- ١:٣ ب- ١:٣:٣:٩ ج- ١:١ د- ١:١:١:١ هـ- ١:٣:١:٣

أنسب كلاً من التزاوجات الآتية إلى النسبة الوراثية التي تمثلها:

الحل:


التزاوج	النسبة الوراثية التي تمثلها:
أ- $TtYy \times TtYy$	١:٣:٣:٩
ب- $Tt \times tt$	١:١
ج- $Tt \times Tt$	١:٣
د- $TtYy \times ttyy$	١:١:١:١

السؤال الرابع :

أكتب الطرز الجينية لكل من الآباء والأبناء والغاميتات.

أفراد الجيل الأول:

P (الطرز الشكلي)	طويل ، ارجواني، مجعد X طويل ، أبيض ، أملس
الطرز الجيني	TtppRR x TtPprr
G	TpR tpR TPr Tpr tPr tpr



السؤال الخامس: الحل:

جينات لون البذور و شكلها مرتبطة و حصل بينها عبورو نتج عن عملية العبور بين الكروماتيدات غير الشقيقة للكروموسومات المتناظرة تكوين غاميتات بتراكيب جينية جديدة تختلف عن الأبوية: و كما يلي

أ بذور مستديرة صفراء بذور مجعدة خضراء

$$\begin{array}{c}
 \text{P} \\
 \begin{array}{cc}
 \begin{array}{|c|c|} \hline R \\ \hline Y \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline R \\ \hline Y \\ \hline \end{array} \\
 \end{array}
 \end{array}
 \times
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|c|} \hline r \\ \hline y \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline r \\ \hline y \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{G} \\
 \begin{array}{cc}
 \begin{array}{|c|} \hline R \\ \hline Y \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline r \\ \hline y \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{F}_1 \\
 \begin{array}{|c|c|} \hline R & r \\ \hline Y & y \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \quad 100\% \text{ بذور مستديرة صفراء}$$

بذور مستديرة صفراء بذور مجعدة خضراء

$$\begin{array}{c}
 \text{F}_1 \text{ (تلقيح اختياري)} \\
 \begin{array}{cc}
 \begin{array}{|c|c|} \hline R & r \\ \hline Y & y \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline r & r \\ \hline y & y \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \times
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|c|} \hline r & r \\ \hline y & y \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$


$$\begin{array}{c}
 \text{G} \\
 \begin{array}{cccc}
 \begin{array}{|c|} \hline R \\ \hline Y \\ \hline \end{array} & , & \begin{array}{|c|} \hline R \\ \hline y \\ \hline \end{array} & , & \begin{array}{|c|} \hline r \\ \hline Y \\ \hline \end{array} & , & \begin{array}{|c|} \hline r \\ \hline y \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

غاميات بتراكيب جينية جديدة

$$\begin{array}{cccc}
 \begin{array}{|c|c|} \hline R & r \\ \hline Y & y \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline R & r \\ \hline y & y \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline r & r \\ \hline Y & y \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|} \hline r & r \\ \hline y & y \\ \hline \end{array} \\
 659 & 36 & 29 & 645 \\
 \text{بذور صفراء مستديرة} & \text{بذور خضراء مستديرة} & \text{بذور صفراء مجعدة} & \text{بذور خضراء مجعدة}
 \end{array}$$

سبب ظهور التراكيب الجينية الجديدة : بذور صفراء مجعدة و بذور خضراء مستديرة هو عملية العبور.

السؤال السادس :الحل.




يلاتيني DD $\frac{1}{4}$ يموت

يلاتيني Dd $\frac{2}{4}$


قضي dd $\frac{1}{4}$

الجين D سائد بالنسبة للون (اللون البلاتيني سائد على القضي) ، متتحي بالنسبة لصفة القتل (جين قاتل متتحي).


السؤال السابع :




السؤال الثامن : الحل : الرجل الأول هو الأب البيولوجي للطفل



السؤال العاشر: الحل: جينات مرتبطة و لم يحدث عبور و كما يلي:





١. يقص كل من الـ DNA البشري (جين هرمون النمو) و بلازميد البكتريا بنفس إنزيم القطع.

٢. يتم ربط الجين البشري مع البلازميد البكتيري.

٣. يتم إدخال البلازميد الى داخل الخلية البكتيرية.

٤. تتكاثر البكتريا المعدلة وراثيا في وسط غذائي مناسب و تنتج هرمون النمو البشري.

٥. يتم استخلاص الإنسولين و تنقيته ليصبح في متناول المرضى.

ذكر مخطط الريش
P $\frac{B}{Z} \frac{b}{Z}$

أنثى غير مخططة الريش
 $\frac{b}{Z} W$

G $\left(\frac{B}{Z} \right) \left(\frac{b}{Z} \right)$

غاميتات الأبوين $\left(\frac{b}{Z} \right) (W)$

F₁ $\frac{B}{Z} \frac{b}{Z}$
ذكر مخطط

$\frac{B}{Z} W$
أنثى مخططة

$\frac{b}{Z} \frac{b}{Z}$
ذكر غير مخطط

$\frac{b}{Z} W$
أنثى غير مخططة

الطرز الجينية
للأفراد الناتجة

السؤال الرابع عشر: . الحل: نرمز لجين الاصابع القصيرة بالرمز G، و لجين الأصابع الطويلة بالرمز g.

رجل بأصابع قصيرة
P $Gg \times$

إمرأة أصابعها طويلة
 gg


G $\left(G \right) \left(g \right)$

$\left(g \right)$

Gg أصابع قصيرة
%50

gg أصابع طويلة
%50

احتمال إنجاب أطفال بأصابع قصيرة هو ٥٠%



الطرز الجينية للأبناء	$\begin{array}{c} B \\ H^+X X_H^B \end{array}$	$\begin{array}{c} B \\ H^+X X_H^b \end{array}$	$\begin{array}{c} B \\ hXY \end{array}$	$\begin{array}{c} b \\ HXY \end{array}$
الطرز الشكلية للأبناء	أنثى سليمة	أنثى سليمة	ذكر سليم	ذكر سليم من نزف
	من كلا المرضين	من كلا المرضين	من عمى الألوان	الدم ، مصاب بعمى
			مصاب بنزف الدم	الألوان

نوع الوراثة : جينات نزف الدم مرتبطة بالجنس ، وجينات عمى الألوان مرتبطة بالجنس
وجينات الصفتان مرتبطتان على نفس الكروموسوم

نرمز لجين الأرجل القصيرة بالرمز A^*

نرمز لجين الأرجل الطويلة بالرمز A

نرمز لجين اللون الأسود بالرمز B

نرمز لجين اللون الأبيض بالرمز R

ذكر أسود الريش
قصير الأرجل

أنثى بيضاء الريش
قصيرة الأرجل

الطراز الجيني للأباء $Z^B Z^B A A^*$ x $Z^R W A A^*$

الغاميتات $Z^B A$, $Z^B A^*$ $Z^R A$, $Z^R A^*$, $W A$, $W A^*$

σ^7 ♀	$Z^R A$	$Z^R A^*$	$W A$	$W A^*$
$Z^B A$	$Z^B Z^R A A$ ذكر رمادي طويل الأرجل	$Z^B Z^R A A^*$ ذكر رمادي قصير الأرجل	$Z^B W A A$ أنثى سوداء طويلة الأرجل	$Z^B W A A^*$ أنثى سوداء قصيرة الأرجل
$Z^B A^*$	$Z^B Z^R A A^*$ ذكر رمادي قصير الأرجل	$Z^B Z^R A^* A^*$ ذكر رمادي قصير الأرجل يموت	$Z^B W A A^*$ أنثى سوداء قصيرة الأرجل	$Z^B W A^* A^*$ سوداء قصيرة الأرجل تموت

نوع الوراثة:

صفة الطول جينات قاتلة (قصير متماثل الجينات يموت)

لون الريش سيادة غير تامة مرتبطة بالجنس

السؤال السابع عشر: الحل:

١. ما المسافة بين جين E وجين F ؟
 بما أن المسافة بين جين F و جين D = ٢٠ سنتيمورغان
 والمسافة بين جين E و جين D = 8 سنتيمورغان
 إذن المسافة بين جين E وجين F هي ٢٠ - ٨ = ١٢ سنتيمورغان
 ٢. أحسب نسبة الارتباط بين الجينات الآتية:
 (أ) D و F

نسبة الارتباط = (100%) - نسبة تكرار التراكيب الجينية الجديدة

$$= 100\% - 20 =$$

$$= 80\%$$

(ب) E و F

$$= 100\% - 12 = 88\%$$

٣. أحدد على الرسم موقع الجين Z والذي يبعد 4 سنتيمورغان عن D ونسبة ارتباطه مع الجين E ٨٨%.
 بما أن نسبة الارتباط بين Z و E = ٨٨%

و نسبة تكرار العبور (المسافة) = ١٢% سنتيمورغان (وحدة خريطة)

إذن الجين Z يقع الى يسار الجين D



السؤال الثامن عشر: الحل:

مصدر الجينات القاتلة المرتبطة بالجنس في عائلة معينة هو الطفرات:

١. في معظم الحالات قد تظهر الطفرة في جينات الأم و بما أنها مرتبطة بالجنس تورثها الأم الى أبنائها الذكور الذين يظهر عليهم المرض و يموتوا قبل سن البلوغ (فلا يمكنهم توريثها لبناتهم) ، كما تورث الأم جين الطفرة لبناتها و اللواتي يكن حاملات للمرض و لا تظهر عليهن الإصابة لوجود جين طفرة واحد و هن بدورهن يورثنها لإبنائهن الذكور.
 ٢. في باقي الحالات قد يكون السبب حدوث طفرة جديدة new mutations في جينات الذكر المصاب بالمرض.

السؤال التاسع عشر: الحل: هل نجح علاج الطفل؟ أفسر الإجابة.


نعم نجح علاج الطفل و كما يظهر من المخطط وجود زيادة بسيطة في عدد خلايا الدم البيضاء خلال الأشهر الاربعة الأولى بعد العلاج يتبع ذلك ارتفاع ملحوظ و مستمر في عدد الخلايا بدءا من الشهر الخامس ليصل الى المستوى الطبيعي تقريبا ٥٥٠٠ خلية / ملم^٣ في الشهر الثامن مع بقاء عدد الخلايا ثابتا ضمن المدى الطبيعي بعد ذلك.

السؤال العشرون :

الحل: تمر البويضة المخصبة بالعديد من الانقسامات المتساوية mitosis لانتاج الكائن الكامل

(الانقسام الأول للبويضة المخصبة يحدد الجانبين الايمن و الأيسر للحشرة) و كما مر معنا في مراحل سابقة أن المادة الوراثية تتضاعف قبل الانقسام لضمان حصول كل خلية بنتية على العدد الطبيعي من الكروموسومات ، و في حالة الفراشة أعلاه إذا كانت البويضة مخصبة مثلا تحمل الكروموسومات الجنسية XX (ذكر) و دخلت الانقسام المتساوي وحدث عدم انفصال كروموسومي للكروموسومات الجنسية بحيث نتجت خليتين أحدهما تحتوي على كروموسوم X واحد (و نسلها من الخلايا) تكون الجانب الأنثوي ، و الخلية الأخرى ستحتوي على ثلاث كروموسومات X و نسلها من الخلايا تكون الجانب الذكري من الفراشة.

او الحل من خلال المخطط الاتي :





أجهزة جسم الإنسان

Human Body Systems



سياحة المسارات البيئية نهج جديد لإحياء التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، وليمكن عشاق الطبيعة الفلسطينية من تحمل مشاق المسار والحفاظ على الاتزان الداخلي أثناء السير، تتأزر كل أجهزة الجسم لتحقيق هذا الهدف.

الوحدة الثالثة : الفصل الاول :الجهاز الهيكلي

اولا : إجابة الأسئلة خلال المحتوى.

سؤال ص ٩١ :

الهيكل العظمي وهيكل المنزل كلاهما يمنحان الشكل العام ويوفران الدعامة والحماية ، ويشبه الهيكل العظمي في الإنسان هيكل الحديد في المنزل لكن يتفوق عليه في قدرته على الحركة كما أن أعضائه حية تساعد في الاستجابة للتغيرات البيئية.

سؤال ص ٩١ :

تحمي عظام الجمجمة الدماغ ، وتحمي عظام الحوض الأعضاء الداخلية كالمثانة وجزء من الأمعاء الغليظة وأعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي والجنين

سؤال ص ٩١ :

تفقد أجسامنا الدعامة والشكل العام والحركة بسهولة ، تصبح أعضاء الجسم غير محمية و يحتاج الجسم الى الأملاح والدهون بكثرة ، يفنقر الجسم الى خلايا الدم .

سؤال ص ٩٢ : عدد عظام الإنسان البالغ ٢٠٦ عظمة

أقسام الجهاز الهيكلي : الهيكل الطرفي والهيكل المحوري

الهيكل العظمي يتكون من

١- الهيكل المحوري الذي يتكون من الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري)

٢- الهيكل الطرفي ويتكون من الحزام الصدري والطرفان العلويان والحزام الحوضي والطرفان السفليان

سؤال ص ٩٣ : ثقب ماغنوم : يمر من خلاله النخاع المستطيل الذي هو امتداد للحبل الشوكي.

سؤال ص ٩٣ : عظام الجمجمة لينة : لتسهيل عملية الولادة حيث ينضغط رأس الطفل لدى اجتيازه عنق الرحم ويمر دون تشوهات ومتباعدة تسمح للجمجمة بالتمدد لتستوعب نمو دماغ الطفل.

سؤال ص ٩٣ :

فقرات العمود الفقري يبلغ عددها ٣٣ فقرة ، منها ٢٤ فقرة متمفصلة ومتحركة وهي (الفقرات العنقية وعددها (٧) ، الفقرات الصدرية وعددها (١٢) ، الفقرات القطنية وعددها (٥)) بالإضافة الى (٩ فقرات ملتحمة أو غير متحركة وهي (الفقرات العجزية وعددها (٥) والفقرات العصعصية وعددها (٤).

سؤال صفحة ص ٩٤: تتصل عظمة الترقوة من الأمام بعظمة القص

سؤال ص ٩٥:

سلبية المرونة سهولة خلع المفصل وقد يؤدي الى تمزق الأربطة والأوتار .

سؤال ص ٩٥: العظم الذي يتمفصل مع تجويف الحق هو عظم الفخذ

سؤال ص ٩٥: أهمية كون الحوض في الأنثى أوسع منه في الرجل ليتلاءم مع وظيفة الحمل والولادة عند الأنثى

سؤال ص ٩٦:

عظام الطرف العلوي		عظام الطرف السفلي	
اسم العظمة	عددها	اسم العظمة	عددها
العضد	١	الفخذ	١
الزند والكعبرة (الساعد)	٢	القصبية والشظية (الساق)	٢
الرسغ	٨	الكاحل	٧
المشط	٥	المشط	٥
سلاميات الأصابع	١٤	سلاميات الأصابع	١٤
		الرضفة	١
المجموع	٣٠		٣٠

سؤال ص ٩٨:

الجزء الأنثوي للعظم يتكون من عظم كثيف وهو عظم صلب وقوي، أما أطراف العظم فيتكون من العظم الاسفنجي الذي يحوي تجاويف تحوي نخاع العظم الأحمر .

سؤال ص ١٠١:

أماكن تواجد الغضاريف في الجسم: الأنف ، صيوان الأذن ، الحنجرة ، القصبية الهوائية و الأقراص بين الفقرات وما يحيط بالمفاصل المتحركة.

سؤال ص ١٠١: بوساطة الانتشار عبر المادة الخلالية

سؤال ص ١٠٢ : الشكل (١٢)

- ١- يغطي نهايات العظم في منطقة المفصل الغضروف اللين نسبياً الذي يحمي العظم و يمنع من احتكاكها مع بعضها بعضاً.
- ٢- أهمية السائل الزلالي لتسهيل حركة انزلاق العظام بمحاذاة بعضها بعضاً (مرونة في الحركة) ، ويقلل من احتكاك غضروفي العظمتين في المفصل
- ٣- الأربطة والأوتار
- ٤- الأربطة : تربط العظام معاً الأوتار تربط العظام بالعضلات

سؤال ص ١٠٣ -

يؤثر على حركة الجسم ففي حالة المفاصل الثابتة تشل حركة الجسم أو أن حركته تصبح بطيئة جداً وفي حالة المفاصل حرة الحركة فتتحرك مفاصل العظام في جميع الجهات (الدوران ، الانثناء ، التقريب.... وقد تؤثر على وظيفة بعض العظام كعظام الجمجمة التي تحمي الدماغ.

ص ١٠٤ / ١٠٥ الشكل (١٧)

- ١- العلاقة بين كتلة العظم والتقدم في العمر لكل من الجنسين.
- ٢- بعد سن الخمسين تفقد النساء كتلتها العظمية بنسبة أكبر من الرجال
- ٣- نتيجة لانخفاض مستوى الأستروجين في الدم
- ٤- أكون فرضية: سترحم الأم نفسها وجنينها من الكالسيوم الذي يحتاجان اليه وربما ينتج عن ذلك هشاشة العظام ، وستصبح العظام ضعيفة سهلة الكسر .
- ٥- مصادر غذائية طبيعية لفيتامين د صفار البيض ، الأسماك ، الكبد ، القشدة ، التين المجفف.....
- ٦- الغدد الدرقية و جارات الدرقية
- ٧- ينصح بالتعرض لأشعة الشمس حيث أنها تحول الدهون في الجلد الى فيتامين د وهذا الفيتامين يساعد على تصنيع هرمون الكالسيتريول في الكلية الضروري لامتصاص ايونات الكالسيوم والفوسفات في القناة الهضمية وتنظيم نسبة الكالسيوم في الدم .

الوحدة الثالثة - الفصل الاول : الجهاز الهيكلي

ثانيا : إجابة أسئلة الفصل صفحة (١٠٧).

السؤال الاول :

رقم الفقرة	١	٢	٣	٤	٥
رمز الاجابة	ج	أ	ب	د	ج

س٢: بسبب أن فقرات العمود الفقري تتصل بعضها ببعض بواسطة أربطة عديدة يفصلها أقراص ليفية غضروفية تعطيه المرونة أثناء الحركة.

س٣: يعتمد نمو العظم على توفر الكالسيوم الذي تخزنه العظام ، وعند الحاجة الى الكالسيوم في مكان ما من الجسم يتم الحصول عليه من العظام لذلك يعد تناول الكالسيوم مهماً وضرورياً للحفاظ على صحة العظام ، والغذاء الصحي لمرضى هشاشة العظم يعتمد على نوعية الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د كالأسماك والحليب والبيض والخضروات والفواكه كالبطاطا الحلوة والبرتقال

س٤: **العظم الكثيف** : تتكون الطبقات الخارجية لجميع العظام من عظم كثيف ، وهو عظم صلب وقوي ، يعطي الجسم القوة والحماية والوحدة البنائية فيه جهاز هافرس.

العظم الاسفنجي : أقل كثافة من العظم الكثيف وفيه عدة تجاويف تحوي نخاع العظم الأحمر ، ويوجد العظم الاسفنجي وسط العظام القصيرة والمسطحة وفي نهاية العظام الطويلة.

س٥:

انها النقطة المركزية لنمو العظم أثناء فترة تكونه .

تحدث عملية نمو العظام من صفيحة غضروفية في مناطق أطراف العظم الطويل وتسمى لوحة طرف العظم اذ يتم تكوين غضروف إضافي يتحول الى عظم مما يؤدي الى استطالة العظمة.

س٦: أ- الأجزاء (١- الأضلاع الحقيقية ٢- الترقوة ٣- القص ٤- غضاريف الأضلاع ٥- الأضلاع الطافية ٦- فقرة صدرية (العمود الفقري)).

ب- يتكون القفص الصدري من ١٢ زوجاً من الأضلاع وعظمة القص والفقرات الصدرية

ج- عدد الأضلاع الكاذبة: ٣ أزواج

د- عظمة القص شكلها مسطحة

الوحدة الثالثة - الفصل الثاني : جهاز الدوران

اولا : إجابة الأسئلة خلال المحتوى.

سؤال ص ١١٠ : لأن البطين الأيسر عند انقباضه يدفع الدم خلال الشريان الأبهر الى جميع أجزاء الجسم (الدورة الدموية الكبرى) بينما انقباض البطين الأيمن يدفع الدم لمسافة قصيرة الى الرئتين (الدورة الدموية الصغرى)

-٢-

الصمام	الموقع	الوظيفة
ثنائي الشرفات (الأذيني البطيني الأيسر)	يقع بين البطين الأيسر والأذنين الأيسر	يحدد اتجاه انتقال الدم من الأذنين الأيسر الى البطين الأيسر ولا يسمح بعودته الى الأذنين الأيسر
ثلاثي الشرفات (الأذيني البطيني الأيمن)	يقع بين الأذنين الأيمن والبطين الأيمن	يحدد اتجاه انتقال الدم من الأذنين الأيمن الى البطين الأيمن ولا يسمح بعودته الى الأذنين الأيمن
نصف القمري (الشريان الرئوي)	يقع بين الشريان الرئوي والبطين الأيمن	يسمح بمرور الدم من البطين الأيمن الى الشريان الرئوي ويمنع عودته الى البطين الأيمن
نصف القمري (الصمام الأبهر)	يقع بين البطين الأيسر وقاعدة الأبهر	يسمح بمرور الدم من البطين الأيسر الى الأبهر ويمنع عودته الى البطين الأيسر

٣- الشريان الرئوي :دم فقير بالأكسجين / الأوردة الرئوية: دم غني بالأكسجين

- ٤- يدخل الدم الفقير بالأكسجين الأذنين الأيمن للقلب -----البطين الأيمن -----الشرابين الرئوية-----
الرئتين(تبادل الغازات) ---الأوردة الرئوية---يعود الدم الغني بالأكسجين الى الأذنين الأيسر ----البطين الأيسر
-----الأبهر ---جميع أنحاء الجسم---وريد أجوف علوي وسفلي -----أذنين أيمن.

سؤال ص ١١٢ :

الشكل (أ) فيه الصمام ثنائي الشرفات والصمام ثلاثي الشرفات (مغلق) والصمامان نصف القمري مفتوح

سؤال ص ١١٤ :

الدم في الأوردة ينقل ويعود الى القلب ليتم ضخه مرة أخرى وتوزيعه الى الجسم ،وكذلك كون الأوردة سطحية وقريبة من الجلد فيسهل الحقن بها.

سؤال ص ١١٤ :

الشعيرة الدموية	الوريد	الشريان	
أقل سماكة من الشريان والوريد	أقل سماكة من الشريان	سميكة	سمك الجدار
طبقة واحدة من خلايا طلائية رقيقة	نفس طبقات الشريان الا ان الطبقة الوسطى أقل	طبقة داخلية من الخلايا الطلائية طبقة وسطى من العضلات الملساء طبقة خارجية من النسيج الضام	الطبقات المكونة له
أقل من الشريان والوريد	أكثر من الشريان	أقل من الوريد	سعة التجويف
لا	نعم	لا	وجود الصمامات

ص ١١٤/١١٥

أسئلة على الشكل (٧) :

١- مكونات خلوية وبلازما

٢- خلايا لييفية ،قاعدية، حمضية ، وحيدة ومتعادلة

٣- خلايا الدم الحمراء عددها ٥-٦ مليون خلية في ملم ٣ من الدم وظيفتها نقل الأوكسجين وثنائي أكسيد الكربون

ولا يوجد فيها نواة للخلية الناضجة

خلايا الدم البيضاء عددها ٥-١٠ آلاف خلية في ملم ٣ من الدم وظيفتها الدفاع والمناعة ويوجد فيها نواة

٤-التوازن الأسموزي، تنظيم درجة الحموضة ، تخثر الدم ، الدفاع ضد مسببات الأمراض

٥-وجود التهابات حيث تقوم خلايا الدم البيضاء بالدفاع عن الجسم ضد مولدات الضد التي تهاجمه.

سؤال ص ١١٥:

بسبب افتقار خلايا الدم الحمراء الناضجة للنواة التي تحتوي على DNA

سؤال ص ١١٦:

يوجد في خلية دم حمراء ٢٥٠ مليون جزئ هيموغلوبين وكل جزئ يحوي أربع جزيئات أكسجين (٢٥٠ مليون × ٤)

= ١٠٠٠ مليون جزئ أكسجين

الوحدة الثالثة - الفصل الثاني : جهاز الدوران

ثانيا : إجابة اسئلة الفصل صفحة (١٢٠).

أسئلة الفصل ص ١٢٠

١	٢	٣	٤	٥
أ	ج	د	أ	ب

س٢: الثقب :يقل النشاط الحركي للطفل مع شحوب مزرق في لون بشرته والسبب أن وجود الثقب بين البطينين الأيمن والأيسر يسمح باختلاط الدم الغني بالأكسجين في البطين الأيسر بدم فقير بالأكسجين يأتيه عبر الثقب من البطين الأيمن ، ونقص الأكسجين في الدم المختلط يسبب ضعف النشاط الحركي للطفل وشعوره بالإرهاق والإعياء وبخاصة عضلة القلب نفسها التي ينقص امدادها بالأكسجين عن طريق الشريان التاجي.

ووجود الدم الفقير بالأكسجين في أوعية الجلد يسبب ظهورها بلون شاحب مزرق.

س٣:يسمى ضغط الدم المرتفع المرض القاتل الصامت وهو مشكلة صحية مهمة اذ يصيب أكثر من ٢٠% من السكان ويسهم في حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية ويؤثر على الكلية وشبكية العين.

س٤: ١- تبدأ عملية تخثر الدم عندما يتحطم الغشاء الطلائي الداخلي للوعاء الدموي بفعل الجرح ، حيث تقوم الصفائح الدموية بالالتصاق على خيوط الكولاجين في النسيج المتهتك وتتجمع بشكل كثيف ، ما يؤدي الى تكون سدادة سريعة تحد من استمرار النزيف.

٢- يتم افراز بروتين الثرومبلاستين من قبل الأوعية الدموية المتحطمة والأنسجة المحيطة.

٣-يقوم بروتين الثرومبلاستين بوجود أيونات الكالسيوم وعوامل التخثر بتحويل بروتين البروثرومبين غير النشط الى بروتين الثرومبين النشط

٤-يحول بروتين الثرومبين بروتين الفيبرينوجين الذائب في الدم الى مادة الفيبرين وهو بروتين لا يذوب في الماء.

٣- يتكون الفيبرين على هيئة شبكة من ألياف تحجز خلايا الدم الحمراء مكونة الخثرة الدموية وبالتالي يتوقف النزيف. وبعد ذلك تذاب الخثرة بواسطة أنزيمات خاصة ويصاحب عملية إزالة الخثرة عملية التئام الجرح وشفائه.

س٥ ١- (رقم ١ وريد ، رقم ٢ شريان)

٢- أ

٣-بسبب الضغط الانقباضي وهو ضغط الدم الناتج عن اندفاع الدم في الشرايين خلال انقباض البطينين .وحتى يتحمل الشريان قوة ضخ الدم تكون الطبقة الوسطى المكونة لجدرانه سميكة

س٦: يستطيع الطالب تصميم البطاقة بالاعتماد على المعلومات الآتية:

١- اذا كانت فصيلة الدم A يستطيع التبرع لشخص فصيلة دمـه A أو AB

٢- اذا كانت فصيلة الدم B يستطيع التبرع لشخص فصيلة دمـه B أو AB

٣- اذا كانت فصيلة الدم AB يستطيع التبرع لشخص فصيلة دمـه AB

٤- اذا كانت فصيلة دمـه O يستطيع التبرع لشخص فصيلة دمـه A أو B أو AB أو O

أما بالنسبة للعامل الرايزيسي فالموجب يعطي الموجب ، أما السالب فيعطي الموجب و السالب

الوحدة الثالثة - الفصل الثالث : الجهاز المناعي

اولا: اجابة الاسئلة خلال المحتوى.

سؤال ص ١٢٤:

يقوم الطحال بإزالة والتخلص من خلايا الدم الحمراء غير الطبيعية وبما أن مريض الثلاسيميا تكون عنده خلايا الدم الحمراء غير طبيعية مما يتسبب في انحسارها داخل الطحال ليبدأ بتحطيمها بعملية البلعمة مؤدياً الى تضخمه

اللقاح : هو مسبب المرض ميت أو ضعيف ، أو جزءاً من مسبب المرض ويهدف الى تعريف الجسم بمولد الضد ، ويستجيب الجسم بتكوين أجسام مضادة ضده وتكوين خلايا ذاكرة ، فيصبح الجسم قادراً على حماية نفسه اذا ما تعرض مستقبلاً لمولد الضد هذا عند الإصابة به.

المصل: هو أجسام مضادة جاهزة ، تعطى في حالة انتشار الأوبئة لحماية الجسم من الأمراض ، كما وتستخدم في معالجة الأشخاص الذين تعرضوا للدغ الأفاعي وتكسب الجسم مناعة جاهزة مؤقتة.

الوحدة الثالثة - الفصل الثالث : الجهاز المناعي

ثانيا : اجابة اسئلة الفصل صفحة (١٣٢ + ١٣٣).

س١:

١	٢	٣	٤	٥
د	ج	ب	أ	د

حمزة : مناعة سلبية

//

س٢: إبراهيم : مناعة إيجابية

س٣: أ- **الطحال:** يقوم بإعادة تدوير خلايا الدم الحمراء القديمة بوساطة عملية البلعمة ، وتخزين الحديد الناتج منها لإعادة استخدامه في تصنيع خلايا دم حمراء جديدة ، كما يقوم بتصفية الدم من مسببات الأمراض ، لذلك يعد جزءاً من جهاز المناعة.

ب- **الإنترفيرون :** مواد بروتينية تفرزها الخلايا المصابة بالفيروسات وخلايا T_H والخلايا الأكولة وتنتقل مع الدم بحيث ترتبط على المستقبلات الموجودة في الغشاء الخلوي للخلايا السليمة المجاورة وتحفزها على إنتاج مواد تمنع تكاثر الفيروس.

ج- **الجرانزيم:** مادة تفرزها خلايا T_C يؤدي الى تحلل DNA الخلية المصابة بالفيروسات أو الخلايا السرطانية وبالتالي موتها.

س٤: خلايا T تشكل ٨٠% من الخلايا الليمفية وتتمايز في الغدة الزعترية.

الخلايا القاتلة الطبيعية : تشكل ٥-١٠% من الخلايا الليمفية وتتمايز في نخاع العظم الأحمر

س٥: **الساييتوكاينات :**

١- تحفيز خلايا T السامة

٢- تحفيز خلايا B

٣- تحفيز الخلايا الأكولة لمساعدتها على إفراز المواد اللازمة لمقاومة مسببات الأمراض بداخلها

٤- تحفيز الخلايا القاتلة الطبيعية (NK) لتدمير الخلايا غير الطبيعية أو المصابة

س٦: خطوات عملية البلعمة:

- ١- تحيط الأقدام الكاذبة بمسبب المرض
- ٢- تعلق مسببات الأمراض وتدخلها الخلية الأكلة الى داخل غشائها الخلوي
- ٣- تتشكل فجوة تحيط بمسبب المرض
- ٤- تلتحم الفجوة مع الجسم الحال
- ٥- تدمر المركبات السامة وأنزيم الليسوزايم مسبب المرض.
- ٦- حطام (بقايا) مسبب المرض تطلق بالإفراز الخلوي

س٧: أ- ١- منطقة متغيرة (V) ٢- منطقة ثابتة (C) ٣- جسور ثنائية الكبريت

٤- موقع ارتباط مولد الضد ٥- سلسلة خفيفة ٦- سلسلة ثقيلة

ب- الجسم المضاد يتكون من ٤ سلاسل عديد الببتيد وترتبط السلاسل معا بجسور ثنائية الكبريت

ج- تختلف الأجسام المضادة عن بعضها بالمنطقة المتغيرة التي ترتبط بمولد ضد محدد.

د- وظيفة IgA يهاجم مسببات الأمراض قبل دخولها الأنسجة ويمنع التصاق الفيروسات والبكتيريا بالأسطح الطلانية.

س٨: ١- لأن الأمراض الرئوية طريقة العدوى فيها الجهاز التنفسي ، بينما الأمراض المعوية طريقة العدوى فيها الجهاز الهضمي وبما أن الطفل يتغذى بالرضاعة الطبيعية وكون حليب الأم معقماً وخالياً من مسببات الأمراض وغنياً بالأجسام المضادة لذلك فإن إصابة الطفل بالأمراض الرئوية تكون أسهل من إصابته بالأمراض المعوية.

٢- لأن الأم اكتسبت مناعة إيجابية من خلال تكوين أجسام مضادة ضد مسبب المرض (الحصبة الألمانية) بعد الإصابة به أو أخذ التطعيم (اللقاح) فيكون الجسم خلايا ذاكرة ويحمي الجسم نفسه من مولد الضد اذا تعرض له مستقبلاً.

س٩: ١- نقص في تحطيم خلايا الدم الحمراء غير الطبيعية (التالفة) وبالتالي زيادة عدد خلايا الدم الحمراء في ١ ملم ٣ دم.

٢- ضعف في جهاز المناعة وذلك لعدم تنقية الدم من مسببات الأمراض.

الوحدة الثالثة - أجهزة جسم الانسان

اجابة اسئلة الوحدة . صفحة (١٣٤+١٣٥+١٣٦+١٣٧)

س: ١

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
د	ج	أ	ج	د	أ	د	أ	ب	د

س٢: أ- **الصفائح الدموية:** في عملية تخثر الدم تقوم الصفائح الدموية بالالتصاق على خيوط الكولاجين في النسيج المتهتك ، وتتجمع بشكل كثيف ما يؤدي الى تكون سدادة سريعة تحد من استمرار النزيف .

الفيبرين : بروتين لا يذوب في الماء ويكون على شكل شبكة من ألياف تحجز خلايا الدم الحمراء مكونة الخثرة الدموية

ب- **خلايا T المنشطة** تفرز الساييتوكاينات التي تحفز خلايا B .

المناعة السائلة: التي تقوم بها خلايا B والتي تختص بالدفاع ضد مولدات الضد ومسببات الأمراض.

س٣: ١- تدخل مسببات المرض الجسم عبر الجلد

٢- تفرز الخلايا الصارية الهستامين

٣- يزداد تدفق الدم الى المنطقة المصابة

٤- تنتقل الخلايا الأكولة الى المنطقة المصابة

٥- تهاجم خلايا الدم البيضاء المتعادلة مسببات المرض وتقتلها.

س٤: ١- **الخلايا الليمفية** وهي خلايا (T) المسؤولة عن المناعة الخلوية و B المسؤولة عن المناعة السائلة و

(الخلايا القاتلة) هي من أنواع خلايا الدم البيضاء وخلايا دم البيضاء هي من مكونات الخلوية للدم.

٢- بما أن الهيموغلوبين يحتاج الى جزئ الحديد لاكمال تكونه فقد يلحق نقص الحديد في الغذاء الى نقص في

بناء الهيموغلوبين والهيموغلوبين هو الذي ينقل الأكسجين فيؤدي ذلك الى نقص في قدرة الدم على نقل الأكسجين .

س٥: ١- **المناعة السائلة.**

٢- الساييتوكاينين الذي يؤدي الى تنشيط خلايا B

٣- A: الأنتجين D: الأجسام المضادة

٤- ترتبط خلايا T المساعدة بالأنتجين الذي ظهر على سطح الخلية الأكولة مما يؤدي الى انقسامها لخلية

٢- تفرز خلية T_H المنشطة مادة الساييتوكاينين التي تؤدي الى تنشيط خلايا B

٣- تتميز خلايا B الى نوعين من الخلايا وهي خلايا بلازمية تفرز أجساما مضادة خاصة بالأنتيجين المحدد .
وخلايا B الذاكرة القادرة على التعرف على نوع الأنتيجين اذا دخل الجسم مرة أخرى.

س٦:

التهاب المفاصل الروماتزمي	التهاب المفاصل العظمي	
يهاجم جهاز المناعة أنسجة الجسم ، ما يؤدي الى التهاب المفاصل وتصلبها وتشوها	تآكل الغضروف المفصلي الزلالي مما يسبب احتكاك العظام بعضها ببعض واصابته بالتلف	سبب الحدوث
IgG	IgE	
الدم والليمف	الجلد والرئتان والأغشية المخاطية	أماكن الوجود
خلايا الدم البيضاء	خلايا الدم الحمراء	
١٠-٥ آلاف خلية	٦-٥ مليون خلية	العدد/ملم ^٣ من الدم

س٧: لن يكون هناك مكان لإنتاج المزيد من خلايا الدم (الحمراء، البيضاء، الصفائح الدموية) وتصبح الحركة صعبة لزيادة كتلة العظم .

س ٨ :أتوقع أن أعداد خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان تزداد بزيادة ارتفاع منطقة الإقامة عن مستوى سطح البحر وكذلك يتزايد حجم القلب وذلك لتمكين الجسم الحصول على كفايته من غاز الأكسجين لأن نسبة الأكسجين في الهواء الجوي تتناقص كلما ارتفعنا أكثر عن سطح البحر.

الفرضية (يتزايد عدد خلايا الدم الحمراء وحجم القلب مع زيادة ارتفاع منطقة سكن الانسان واقامته الدائمة ، وذلك بهدف زيادة كفاءة الدم في تبادل ونقل الغازات التنفسية

س٩ : ١- الجمجمة والعظام المرتبطة بها : حماية الدماغ

٢- الترقوة: تعمل كدعامة من خلال اتصالها من الأمام بعظمة القص ومن الخلف بلوح الكتف

٣- العمود الفقري: يوفر دعامة للجسم ويحمل معظم ثقله ويشكل قناة فقرية يمر فيها الحبل الشوكي لحمايته

٤-القص : تتصل بها أضلاع القفص الصدري(الحقيقية والكاذبة) الذي يحمي القلب والرئتين

س١٠: يفضل إعطاء خالد مصلاً بسبب لدغه أفعى ، لأن المصل عبارة عن أجسام مضادة جاهزة تكسبه مناعة سريعة ومؤقتة ، أما اللقاح فيحتاج فترة حتى يكون الجسم أجساماً مضادة.

س١١:أ- الحقن الأول مستوى الأجسام المضادة في الدم أقل من الحقن الثاني.، وكذلك الزمن الذي احتاجه الحقن الأول لإنتاج الأجسام المضادة كان أطول من الحقن الثاني استجابة الحقن الأول بطيئة بينما استجابة الحقن الثاني أسرع.

ب- الخلايا البلازمية

ج- الحقن الأول ، الحقن الثاني بنفس مولد الضد يتم كشفه سريعاً بواسطة خلايا B الذاكرة القادرة على التعرف على مولد الضد ثم تنقسم وتتمايز الى خلايا بلازمية تفرز أجساماً مضادة وباستجابة سريعة.



الكائنات الدقيقة Microorganisms



قال تعالى:

(فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾) (الحاقة)

الوحدة الرابعة - الفصل الاول : البكتيريا

اولا : الاسئلة خلال المحتوى

سؤال ص ١٤٢ :

من خلال تعكر لون الوسط السائل نتيجة لنمو البكتيريا وتراكم نواتج عمليات الأيض

سؤال ص ١٤٨

قد يؤدي ذلك للقضاء على البكتيريا من خلال عملية البلعمة التي تقوم بها خلايا الدم البيضاء

سؤال ص ١٥٣

- ١- لأن ذلك يؤدي إلى زيادة معدل عمليات الأيض و العمليات الحيوية و بالتالي زيادة نمو و انقسام البكتيريا
- ٢- درجة الحرارة المثلى: هي الدرجة التي يصل فيها معدل النمو البكتيري إلى أقصى درجة و يمكن تحديدها على المنحنى المقابل حيث تبلغ قيمتها ٣٧م.
- ٣- لأن درجات الحرارة المرتفعة تحطم الإنزيمات و البروتينات في الخلية.

سؤال ص ١٥٠

لأنه عند توفر الظروف المناسبة فإن كل بوع ينمو وينتج خلية بكتيرية واحدة(بكتيريوم)

سؤال ص ١٥١

لأن الحمض النووي يستطيع أن ينفذ للخلية البكتيرية من خلال اغلفتها الخارجية بدون مساعدة بروتينية

سؤال ص ١٥٢

يعتمد على عمر المزرعة وتركيب الوسط وظروف النمو ونوع البكتيريا

سؤال ص ١٥٣

من خلال ملاحظة تواجد النمو البكتيري :

أ- اذا تركز النمو بالقرب من السطح تكون البكتيريا هوائية اجبارية.

ب- اذا تركز النمو في قاع الوسط الغذائي تكون البكتيريا لاهوائية اجبارية.

ج- اذا انتشرت البكتيريا في انحاء الوسط الغذائي وازداد عددها بالقرب من السطح تكون هوائية اختيارية

سؤال صفحة ١٥٦

لوجود أنواع من البكتيريا لديها القدرة على تحليل النفط

الوحدة الرابعة - الفصل الاول : البكتيريا

ثانيا : اجابة اسئلة الفصل الاول. (١٥٩+١٥٩)

السؤال الأول:

رقم السؤال	١	٢	٣	٤
رمز الإجابة	ج	أ	ب	ب

السؤال الثاني: تصنف البكتيريا استناداً إلى شكلها وتركيبها ووظائفها وتفاعلها مع أنواع معينة من الأصباغ

السؤال الثالث : مقارنة بين البكتيريا القديمة والبكتيريا الحقيقية

وجه المقارنة	البكتيريا القديمة	البكتيريا الحقيقية
تركيب الجدار الخلوي	يخلو الجدار الخلوي من مادة الببتيدوغلايكان	يدخل في تركيب جدارها الخلوي مادة الببتيدوغلايكان
ظروف المعيشة	تنمو في بيئات شديدة القساوة كالمستنقعات والمياه المالحة والينابيع الحارة	منها ما هو حر المعيشة في التربة ، ومنها ما هو متطفل على كائنات أخرى وبعضها رمية تحلل الأجسام الميتة وبعضها ذاتية التغذية ضوئية أو كيميائية

السؤال الرابع: أ- البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا ب- البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق

ج- البكتيريا المسببة لمرض الكوليرا د- البكتيريا المسببة لمرض الزهري

السؤال الخامس: الميسوسومات: تحتوي على الأنزيمات الخاصة بعملية التنفس

الشعيرات الجنسية: تستعمل لنقل المادة الوراثية بين الخلايا البكتيرية أثناء عملية الاقتران مما يؤدي الى التنوع البكتيري.

الأسواط: المساعدة على الحركة الدورانية للبكتيريا في الوسط الذي تعيش فيه.

السؤال السادس: ١- المحفظة ٢- الجدار الخلوي ٣- الزوائد ٤- الأبواغ الداخلية ٥- البلازميد

السؤال السابع: أعلل لما يأتي:

١- بسبب طبيعة تركيب جدرها وأغشيتها الخلوية التي تمكنها من تحمل الظروف القاسية

وصبغة فيكوسيانين التي توجد داخل أغشية خاصة تمكنها من القيام بعملية البناء الضوئي. a. ٢- لأنها تحتوي على صبغة كلوروفيل

٣- لامتلاكها خصائص مميزة مثل تراكيبها الوراثية البسيطة واحتوائها على بلازميد وسهولة تنميتها وسرعة تكاثرها.

٤- لآثارها الجانبية مثل البنسلين أو قد تؤدي لموت البكتيريا النافعة في الجسم ولها تأثير سلبي على بعض أعضاء الجسم مثل الكلى، ويؤدي الى نشوء سلالة من البكتيريا مقاومة لهذا النوع من المضادات الحيوية .

السؤال الثامن: أ- هوائية اجبارية مثل البكتيريا المسببة لمرض السل.

ب- لاهوائية اجبارية مثل البكتيريا المسببة لمرض الكزاز.

ج- هوائية اختيارية: مثل بكتيريا القولون.

السؤال التاسع: ١: ١- المحفظة ٣- الغشاء الخلوي ٥- الزوائد ٦- المنطقة النووية ٤-DNA

٢- صنفت البكتيريا اعتماداً على تركيب الجدار الخلوي إلى بكتيريا موجبة غرام وسالبة غرام

وجه المقارنة	بكتيريا موجبة غرام	بكتيريا سالبة غرام
تركيب الجدار الخلوي	طبقة سميكة من الببتيدوغلايكان تحيط بالغشاء الخلوي	يحتوي جدارها على طبقة رقيقة من الببتيدوغلايكان تنحصر بين الغشاء الخلوي والغشاء الخارجي الذي يحتوي على كميات كبيرة من الليبيدات السكرية
لون الصبغة التي تكتسبها البكتيريا	اللون البنفسجي	اللون الزهري

السؤال العاشر: لأنها تستخدم الطاقة الكيميائية الناتجة من أكسدة وتحليل عناصر ومركبات غير عضوية مثل الأمونيا لتثبيت ثاني أكسيد الكربون وصنع الغذاء

السؤال الحادي عشر

-لعدم امكانية حدوث عملية انقسام منصف و تكوين غاميتات لان العملية تحتاج لأزواج من الكروموسومات المتماثلة بينما البكتيريا تمتلك كروموسوم وحيد.

-عدم امتلاكها مريكزات كما في الخلايا الحيوانية للمساعدة على الانقسام.

الوحدة الرابعة - الفصل الثاني : الفيروسات

أولا : الاسئلة خلال المحتوى

سؤال ص ١٦٤ :

لأن DNA الفيروس الناتج من عملية النسخ العكسي يندمج مع DNA الخلية المصابة مسببا تغيرات في ترجمة الجينات الخاصة بالخلية المصابة

سؤال ص ١٦٥

لأنها تسبب تحلل الخلايا وانفجارها نتيجة التكاثر الفوري للفيروس

سؤال ص ١٦٦

لان الفيروسات تتكاثر داخل خلايا العائل وبالتالي يصعب ايجاد علاج يقضي علي الفيروس دون ان يؤثر علي خلايا العائل

الوحدة الرابعة - الفصل الثاني : الفيروسات

ثانيا : اجابة اسئلة الفصل الاول. (١٦٨)

السؤال الاول

السؤال	١	٢	٣	٤
رمز الإجابة	ب	ج	ب	أ

السؤال الثاني : ١- تركيب الفيروسات على اختلاف أشكالها:

حمض نووي DNA أو RNA محاط بغطاء بروتيني يسمى كابسيد وفي بعض الفيروسات يحيط بالغطاء

غلاف خاص يتكون من دهون وبروتينات وكربوهيدرات وعند سطح الغطاء توجد نتوءات مكونة من بروتين سكري (غلايكو بروتين) .

تشبه الجمام	تشبه الكائنات الحية
تخلو من العضيات التي تمكنها من القيام بالوظائف الحيوية	تحتوي على مادة وراثية محاطة بغطاء بروتيني
تتبلور خارج خلايا العائل وتفقد القدرة على القيام بالوظائف الحيوية	تتكاثر داخل خلايا العائل وتنتج فيروسات جديدة
لا تنمو ولا يزداد حجمها	تحدث بها طفرات وتنتج سلالات جديدة

السؤال الثالث:

١- فيروس تبرقش التبغ وفيروس الحصبة ٢- فيروس الانفلونزا ٣- فيروس جدري الماء

٤- فيروس الكبد الوبائي (B) ٥- فيروس الحصبة والانفلونزا والايذز

السؤال الرابع:

نوع الحمض النووي ، طرق الانتقال ، نوع الكائن المضيف ، شكل الفيروس . وجود الغلاف الخارجي

السؤال الخامس: الدورة المحللة :

وتتضمن هذه الدورة المراحل الآتية:

- 1) **التصاق الفيروس Attachment**: يرتبط الفيروس بواسطة ألياف الذيل بموقع استقبال خاص Receptor Site على السطح الخارجي لجدار الخلية البكتيرية.
- 2) **حقن المادة الوراثية Injection**: يقوم الفيروس بحقن مادته الوراثية (DNA) داخل خلية العائل، ويبقى الغطاء البروتيني خارج الخلية.
- 3) **التضاعف والبناء Biosynthesis**: يوجه DNA الفيروسي الخلية لمضاعفة مادته الوراثية وبناء بروتيناته مستخدماً أنزيمات العائل ومكوناته الخلوية.
- 4) **التجميع Assembly**: يتم تجميع مكونات الفيروس بعضها مع بعض لإنتاج فيروسات جديدة.
- 5) **خروج الفيروسات Release**: تنفجر الخلية البكتيرية وتتحلل مطلقة الفيروسات الجديدة.

السؤال السادس:

أ- الأعراض: ارتفاع في درجة الحرارة ، الام في العضلات والمفاصل واحتقان الانف

ب- لا يوجد علاج فعال للأمراض الفيروسية الا انه يوجد ادوية حديثة تعمل علي الحد من انتشار الفيروسات في الجسم من خلال تنشيط جهاز المناعة ومن ثم القضاء عليها

السؤال السابع:

١- لأنها لا تستطيع التكاثر الا عندما تهاجم خلايا الكائن الحي معتمدة علي مكوناتها الخلوية لمضاعفة مادتها الوراثية وتكوين بروتيناتها لذلك تعد الفيروسات متطفلة اجبارية داخلية

٢- لان الفيروسات تستخدم في القضاء علي بعض انواع الحشرات والآفات الزراعية

٣- لان الفيروسات تؤدي الي تلف وتحطيم خلايا الجهاز التنفسي والأنسجة الطلائية المبطنة له فتسهل العدوى البكتيرية.

السؤال الثامن:

١- راس : ٢ : DNA ٣ : عنق ٤ : ذيل

٢- الياف الذيل تساعد الفيروس علي الالتصاق بمستقبلاته علي جدر الخلايا البكتيرية

السؤال التاسع:

قد تتشابه مواقع الاستقبال عند انواع مختلفة من الانسجة مما يؤدي لإصابته بنفس النوع من الفيروسات

السؤال العاشر:

اعتقد العلماء ان الفيروسات كانت خلايا حية صغيرة تتطفل على خلايا حية كبيرة و بمرور الوقت فقدت الجينات التي لا تحتاج اليها للتطفل و يدعم هذه النظرية ان بكتيريا الكلاميديا لا تتكاثر إلا داخل خلايا حية مضيضة (خلايا العائل) و السبب يعود إلى فقدتها الجينات التي تمكنها من العيش مستقلة بدون عائل. أي ان الفيروسات نشأت نتيجة تطور رجعي لكائنات دقيقة كانت تعيش معيشة حرة تطورت رجعيا لتفقد أشكالها و تراكيبها الاصلية و اصبحت جزيئات متطفلة على كائنات أخرى

الوحدة الرابعة - اجابة اسئلة الوحدة . (صفحة ١٧٠)

السؤال الاول

٥	٤	٣	٢	١	رقم السؤال
ج	ب	ج	ب	د	رمز الإجابة

السؤال الثاني

وجه المقارنة	بكتيريا موجبة غرام	بكتيريا سالبة غرام
تركيب الجدار الخلوي	طبقة سميكة من الببتيدوغلايكان تحيط بالغشاء الخلوي	يحتوي جدارها على طبقة رقيقة من الببتيدوغلايكان تنحصر بين الغشاء الخلوي والغشاء الخارجي الذي يحتوي على كميات كبيرة من الليبيدات السكرية
لون الصبغة التي تكتسبها البكتيريا	اللون البنفسجي	اللون الزهري

السؤال الثالث

وجه المقارنة	خلية بكتيرية	خلية نباتية
وجود النواه	لا تحتوي علي نواه حقيقية وتوجد المادة الوراثية علي شكل كرموسوم وحد ملتف غير محاط بغلاف نووي	توجد نواة حقيقية حيث تحاط المادة الوراثية بغلاف نووي
تركيب الجدار الخلوي	يتكون من مادة الببتيدوغلايكان	يتكون من مادة السيليلوز ومواد أخرى
وجود العضيات	تخلو من العضيات باستثناء رايبوسومات صغيرة	تحتوي علي عضيات مختلفة مثل الميتوكوندريا وجهاز غولجي
وجود الصبغات	توجد صبغات الكلوروفيل داخل اغشية خاصة	توجد صبغات الكلوروفيل داخل بلاستيدات خضراء

السؤال الرابع:

أ- الابواغ - المحفظة -البلازميد -الجدار الخلوي

ب- الابواغ تتكون من حمض عضوي قوي واملاح كالسيوم تحيط بالمنطقة النووية البكتيرية

- المحفظة طبقة مخاطية تتكون من كربوهيدرات عديد التسكر و ماء.
- البلازميد جزئ DNA حلقي يتضاعف بشكل مستقل عن الكروموسوم البكتيري .
- الجدار الخلوي يتكون من مادة الببتيدوغلايكان.

السؤال الخامس:

التسخين ٢- الترشيح ٣- الاشعة فوق البنفسجية ٤- المواد الكيميائية ٥- التجمد والتبريد

السؤال السادس:

أ- ١- تحطم الفيروسات الخلايا المصابة عند تكاثرها مسببه اعراض المرض

٣- تتدخل في العمليات الحيوية

٤- تندمج مع DNA الخلايا المصابة لإنتاج بروتيناتها ومضاعفة مادتها الوراثية.

ب- تؤدي العلاجات الحديثة الي الحد من انتشار الفيروسات فتنشط جهاز المناعة للقضاء عليها

السؤال السابع: أ- أ- الطور التحضيري ب- طور النمو اللوغاريتمي ج- طور الثبات د- طور الموت

ب- بسبب استهلاك المواد الغذائية وتجمع نواتج عمليات الايض السامة

ج- في الطور التحضيري

السؤال الثامن :

١- في مجال الزراعة حيث تستخدم الفيروسات في نقل جينات بعض الصفات المرغوب فيها من كائن لآخر كما تستخدم في

٢- مضاعفة كمية المحاصيل وفي مكافحة الحيوية للقضاء علي الآفات الزراعية .

٣- في الطب استخدمت الفيروسات في علاج عدة امراض مثل النقص المناعي الحاد واستخدمت لإنتاج اللقاحات و في لابعاث المتعلقة بالعلاج الجيني.

السؤال التاسع:

تترك الاجابة للطالب لإبداء رأيه وتوقعاته.

السؤال العاشر:

الشكل (أ) يمثل تكاثر الفيروسات و الشكل (ب) يمثل تكاثر البكتيريا.

نلاحظ ان تكاثر البكتيريا يكون بنسب لوغاريتمية متصاعدة فيأخذ المنحنى شكلا منتظما بينما تتكاثر الفيروسات بنسب غير ثابتة حيث يتكاثر الفيروس داخل خلية ثم ينتقل لخلية اخرى و يعيد الخطوات في الخلية التالية فنلاحظ تكرار شكل المنحنى مع تزايد عدد الفيروسات

انتهت الاجابات

وما توفيقي الا بالله