




ملاحظة: عدد أسئلة الورقة (ستة) أسئلة، أجب عن (خمسة) منها فقط

القسم الأول: يتكون هذا القسم من (ثلاثة) أسئلة، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعاً.

السؤال الأول: (20 علامة)

- يتكون هذا السؤال من (10) فقرات من نوع اختيار من متعدد، من أربعة بدائل، اختر البديل الصحيح، ثم انقله إلى دفتر الإجابة:
1. ما أكبر عدد ممكن من الإلكترونات تمتلك الأرقام الكمية $(n=3, m=0)$ ؟
 (2) -
 (6) -
 (10) -
 (14) -
 2. عنصر عدده الذري (Y) يقع في المجموعة IIA والدورة الرابعة، ما رقم مجموعة العنصر الذي عدده الذري $(Y+3)$ ؟
 IIIA -
 VA -
 VB -
 VIB -
 3. ما عدد إلكترونات التكافؤ للعنصر الذي يمتلك طاقات التأين الأربعة: (512 ، 1100 ، 2800 ، 10450) كيلو جول/مول ؟
 (1) -
 (2) -
 (3) -
 (4) -
 4. أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بمحلول الحمضين $(6 \times 10^{-6} = K_a, HX)$ و $(8 \times 10^{-8} = K_a, HY)$ ؟
 - قيمة pH للحمض HX أعلى
 - قيمة pH للحمض HY أعلى
 - $[H_3O^+]$ في محلول HX أقل
 - $[H_3O^+]$ في محلول HY أعلى
 5. ما الناتج العضوي لتفاعل حمض البروبانويك CH_3CH_2COOH مع CH_3OH في وسط حمضي ؟
 ($CH_3CH_2-C(=O)-O-CH_3$) -
 ($H_3C-C(=O)-OH$) -
 ($CH_3-C(=O)-CH_3$) -
 ($H_3C-C(OH)(CH_3)-CH_3$) -
 6. ما حجم محلول NaOH تركيزه (0.4 مول / لتر) اللازم لمعادلة (200) مل من محلول (H_2SO_4) تركيزه (0.2 مول / لتر) ؟
 (100 مل) -
 (150 مل) -
 (200 مل) -
 (250 مل) -
 7. ما العبارة الصحيحة لتفاعل كيميائي قيم $(\Delta H, \Delta S)$ له سالبة ؟
 - تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة
 - غير تلقائي عند جميع درجات الحرارة
 - تلقائي عند درجات الحرارة المرتفعة
 - تلقائي عند جميع درجات الحرارة
 ما قيمة ΔG° في عملية ما، إذا كانت $(\Delta S^\circ = 100 \text{ جول / كلفن}, \Delta H^\circ = 100 \text{ كيلو جول})$ عند 400 كلفن ؟
 (50 كيلو جول) -
 (100 جول) -
 (399 جول) -
 (60 كيلو جول) -
- في العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالمهبط في الخلية الجلفانية ؟
 قطب سالب، يحدث عنده تفاعل التأكسد
 قطب موجب، يحدث عنده تفاعل التأكسد
 قطب سالب، يحدث عنده تفاعل الاختزال
 قطب موجب، يحدث عنده تفاعل الاختزال



الآلية صحيح فيما يتعلق بالخلية الجلفانية في الشكل المجاور؟
 نصف تفاعل الاختزال: $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$
 بمسك Zn كعامل مؤكسد و Cu كعامل مختزل
 تقوم أيونات Cl^- بمعادلة أيونات Zn^{2+} الزائدة
 تترسب كتلة صغيرة Cu وترداد كتلة صغيرة Zn

المسألة الثانية: (20 علامة)

(أ) عند انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين المهيجة من المستوى (n) إلى المستوى الثالث كان طول موجة الفوتون المنبعث $1.28 \times 10^{-6} \text{ m}$. أجب عن الأسئلة الآتية:
 (عطاً بأن $1.8 \times 10^{-18} \text{ J}$ ، وثابت ريدبيرج $1.1 \times 10^{-7} \text{ m}^{-1}$ ، $6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ ، من $3 \times 10^8 \text{ m/s}$).
 1. رقم المدار (n).
 2. عدد المستويات الفرعية في المستوى الرئيسي (n).
 3. عدد التفرعات المحتملة من المدار (n) للمدار الثالث.

(ب) قارن بين الحزبين C_2H_2 و NH_3 من حيث:
 1. تمثيل نوسر للحزبي.
 2. شكل أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية.
 3. شكل الحزبي.
 4. الأفلك المتداخلة في تكوين الروابط.
 (عطاً بأن: $C=6, N=7, H=1$)


(ج) محلول مكون من (0.2 مول/لتر) من الحمض الافتراضي $RCOOH$ ($K_a = 1 \times 10^{-5}$)، و (0.4 مول/لتر) من $RCOONa$. أجب عن الأسئلة الآتية:
 1. حدد الأيون المشترك.
 2. حدد الزوجين المتلازمين من الحمض والقاعدة عند تأين الحمض في الماء.
 3. احسب pH للمحلول بعد إضافة (0.1 مول) من حمض HCl إلى لتر من المحلول السابق (أهمل التغير في الحجم).
 (20 علامة)

(أ) من خلال دراستك لوحدة الديناميكا الحرارية وسرعة التفاعلات الكيميائية، أجب عن الأسئلة الآتية: (8 علامات)

1. ما المقصود بدرجة الحرارة؟
 2. تؤدي عملية الانصهار إلى زيادة العشوائية، فسر ذلك.
 3. يبين الجدول الآتي بيانات تفاعل افتراضي عند درجة حرارة معينة، $AB_{(g)} \rightarrow A_{(g)} + B_{(g)}$. أجب عن الأسئلة الآتية:
 - حدد رتبة التفاعل.
 - اكتب قانون سرعة التفاعل.
 - احسب قيمة k وما وحدته؟
 - جد قيمة عمر النصف $t_{1/2}$ لتفكك (AB).

[AB] مول / لتر	0.2	0.180	0.16	0.120	0.060	0
الزمن (ث)	0	10	20	40	70	100

(ب) في ضوء دراستك لوحدة الكيمياء العضوية، أجب عن الأسئلة الآتية: (6 علامات)



- عناصر الأتية متتالية في أعدادها الذرية من اليسار لليمين (A, B, C, D, E, F, G) عند الانتقال من العنصر إلى العنصر E لوحظ ازدياد كبير في الحجم الذري، أجب عن الأسئلة التالية:
1. أي منها عنصر انتقالي محدد مجموعته، علماً بأنه يقع في الدورة الرابعة؟
 2. أي العناصر السابقة يعتبر عامل مؤكسد قوي؟
 3. أيهما يمتلك صفات باراً مغناطيسية أكبر A أم B؟
 4. أكتب صيغة المركب الناتج من اتحاد C مع F.
 5. أي العناصر السابقة يحمل أكبر قيمة لطاقة التأين الثانية، معللاً إجابته؟

القسم الثاني: يتكون هذا القسم من (ثلاثة) أسئلة، وعلى المشترك أن يجيب عن سؤاليين منها فقط.

السؤال الرابع: (20 علامة)

- (أ) إذا كان عدد أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية في الجزيء MX_3 هو ثلاثة أزواج، أجب عما يأتي: (6 علامات)
1. ما نوع تهجين الذرة المركزية؟
 2. ارسم شكل الجزيء، وسميه.
 3. ما عدد أزواج الإلكترونات غير الرابطة حول الذرة المركزية؟
 4. ما قيمة الزاوية لهذا الجزيء؟

(ب) يبين الجدول المجاور محاليل لحموض وقواعد عند نفس التركيز (1 مول / لتر) ومعلومات عنها: (8 علامات)

المحلول	المعلومات
الحمض HCN	$5 \cdot 10^{-2} = [H_3O^+]$
الحمض HNO_2	$4 \cdot 10^{-5} = K_a$
القاعدة C_5H_5N	$9 \cdot 10^{-4} = K_b$
القاعدة N_2H_4	$3 \cdot 10^{-1} = [OH^-]$

- (ج) أجب عن الأسئلة الآتية: (20 علامة)
1. أي الحمض هو الأقوى HNO_2 أم HCN ؟
 2. أي القاعدتين المرافقتين أقوى NO_2^- أم CN^- ؟
 3. أي الأيونات (NO_2^- أم CN^-) له قدرة أكبر على التصفية؟
 4. أي المحلولين له أقل pH (N_2H_4 أم C_5H_5N)؟
 5. احسب K_b للقاعدة N_2H_4 .
 6. اكتب معادلة تفاعل HCN مع KNO_2 ثم حدد الجهة التي يرجحها الاتزان.


(د) أجب عن الأسئلة الآتية: (6 علامات)

المادة	$S = \text{جول} / \text{مول كلفن}$
$B_{2(g)}$	410
$A_{(s)}$	11.4
$AB_{2(g)}$	427.2

1. ما المقصود بالقانون الثاني في الديناميكا الحرارية؟
2. يكون التفاعل ($I_2 \rightarrow 2I$) غير تلقائي عند درجات الحرارة المنخفضة، فسر ذلك.
3. بالاعتماد على البيانات في الجدول المجاور، بين ما إذا كان التفاعل الآتي:
 $A_{(s)} + B_{2(g)} \rightarrow AB_{2(g)} \quad \Delta H = -394 \text{ KJ}$
 عند درجة حرارة (298 كلفن وضغط 1 جوي) تلقائياً أم غير تلقائياً، مع التفسير؟

السؤال الخامس: (20 علامة)

- (أ) الشكل المجاور يبين عدة انتقالات للإلكترون عند عودته في ذرة الهيدروجين، ارسمه جيداً، وأجب عما يأتي: (8 علامات)
1. أي المدارات أكبر طاقة K أم N؟
 2. حدد رمز الفوتون الأطول في الشكل.
 3. احسب قيمة الطاقة المنبعثة للفوتون B علماً بأن ($1 = 2.18 \cdot 10^{-18} \text{ جول}$).
 4. ما عدد النقلات الكلية المحتملة لعودة الإلكترون من N إلى K؟
 5. ما رموز المستويات الفرعية للمستوى الرئيس M؟
 6. ما قيم العدد الكمي الفرعي (l) للمستوى N؟



(6 علامات)

المركب	المعلومات
A	مركب عضوي صيغته العامة C_3H_5Br
B	ينتج من تفاعل المركب A مع $NaOH$ / وسط مائي
C	ينتج من أكسدة B بواسطة $KMnO_4 / H^+$
D	ينتج من تفاعل B مع C بوجود حمض معدي

(6 علامات)

بعد دراستك للكيمياء العضوية أجب عن الأسئلة الآتية:
درس المعلومات المبينة في الجدول حول المركبات العضوية ذات الرموز الافتراضية (A, B, C, D) بناءً عليها، حدد هوية هذه المركبات.
2- بين بالمعادلات كيف يمكن التمييز مخبرياً بين المركبين (A, C).


ج) لديك العنصران (^{42}K ، ^{40}L) ، أجب عن الأسئلة الآتية:

1. اكتب التوزيع الإلكتروني للعنصر K.
2. اذكر اثنين من خصائص العنصر L.
3. قارن بين العنصرين من حيث عدد الإلكترونات المقيدة.
4. اكتب رقم التأكد الشائع للعنصر L.

السؤال السادس: (20 علامة)


أ) في ضوء دراستك لوحدية الحموض والقواعد أجب عن الأسئلة الآتية:

1. عرّف: المعايرة التمهية.
2. ادرس المعادلات الآتية: ثم أجب عن الأسئلة التالية لها:



- حدد حمض وقاعدة لويس في المعادلات السابقة، مع التفسير.
- قم لويس تعريفاً للحمض والقاعدة أكثر شمولية من تعريف برونستد-لوري وأرهينيوس، وضع ذلك.

ب) اعتماداً على الشكل المجاور للتفاعل الافتراضي الآتي: $(A_2 + B_2 \rightarrow 2AB)$ ، أجب عن الأسئلة الآتية: (6 علامات)



1. ما نوع التفاعل الكيميائي وفق تغيرات الطاقة المصاحبة.
2. جد قيمة كل من: - طاقة وضع المتفاعلات - طاقة المعقد المنشط
3. ارسم آلية تكون المعقد المنشط في التفاعل السابق ليعطي المواد الناتجة.

(6 علامات)

ج) من أهم تفاعلات الإضافة، تفاعل غرينيارد:

1. ما الصيغة العامة له؟
2. كيف يتم تحضيره؟
3. وضح بمعادلات كيف يمكن تحضير 2- ميثيل - 2-بروبانول مستخدماً مركب غرينيارد المناسب لذلك، وأي مادة عضوية أخرى مناسبة.

انتهت الأسئلة